

Übungsaufgaben mit Lösungen zu Lineargleichungssystemen

Wolfgang Kippels

29. September 2016

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Übungsaufgaben	3
2.1	Aufgabe 1	3
2.2	Aufgabe 2	3
2.3	Aufgabe 3	3
2.4	Aufgabe 4	3
2.5	Aufgabe 5	4
2.6	Aufgabe 6	4
2.7	Aufgabe 7	4
2.8	Aufgabe 8	4
2.9	Aufgabe 9	4
2.10	Aufgabe 10	4
2.11	Aufgabe 11	4
2.12	Aufgabe 12	4
2.13	Aufgabe 13	5
2.14	Aufgabe 14	5
2.15	Aufgabe 15	5
2.16	Aufgabe 16	5
2.17	Aufgabe 17	5
3	Lösungen	6
3.1	Aufgabe 1	6
3.2	Aufgabe 2	6
3.3	Aufgabe 3	6
3.4	Aufgabe 4	6
3.5	Aufgabe 5	6

3.6	Aufgabe 6	6
3.7	Aufgabe 7	6
3.8	Aufgabe 8	6
3.9	Aufgabe 9	6
3.10	Aufgabe 10	6
3.11	Aufgabe 11	6
3.12	Aufgabe 12	7
3.13	Aufgabe 13	7
3.14	Aufgabe 14	7
3.15	Aufgabe 15	7
3.16	Aufgabe 16	7
3.17	Aufgabe 17	7
4	Komplette Lösungswege	8
4.1	Aufgabe 1	8
4.2	Aufgabe 2	9
4.3	Aufgabe 3	9
4.4	Aufgabe 4	10
4.5	Aufgabe 5	11
4.6	Aufgabe 6	12
4.7	Aufgabe 7	14
4.8	Aufgabe 8	15
4.9	Aufgabe 9	16
4.10	Aufgabe 10	17
4.11	Aufgabe 11	18
4.12	Aufgabe 12	20
4.13	Aufgabe 13	21
4.14	Aufgabe 14	22
4.15	Aufgabe 15	23
4.16	Aufgabe 16	25
4.17	Aufgabe 17	26

1 Einleitung

Zur Lösung von Lineargleichungssystemen können unterschiedliche Lösungsverfahren verwendet werden. In den Musterlösungen am Schluss werden folgende Verfahren verwendet:

- Das Einsetzungsverfahren
- Das Additions-/Subtraktionsverfahren
- Die Cramersche Regel

Einzelheiten zu den Verfahren sind hier zu finden:

Einsetzungsverfahren: <http://www.dk4ek.de/lib/exe/fetch.php/einsetz.pdf>

Additions-/Subtr.-Verfahren: <http://www.dk4ek.de/lib/exe/fetch.php/add.pdf>

Cramersche Regel: <http://www.dk4ek.de/lib/exe/fetch.php/cramer.pdf>

Darüber hinaus existieren auch noch andere Verfahren wie das Gleichsetzungsverfahren¹ oder das Gauß-Jordan-Verfahren², die hier aber nicht angewendet wurden.

2 Übungsaufgaben

2.1 Aufgabe 1

$$\begin{aligned}(1) \quad 2x - 3y &= 12 \\(2) \quad 5x + 2y &= 11\end{aligned}$$

2.2 Aufgabe 2

$$\begin{aligned}(1) \quad 5x - 5y &= 5 \\(2) \quad 5x + 4y &= -22\end{aligned}$$

2.3 Aufgabe 3

$$\begin{aligned}(1) \quad -2x + 5y &= -2 \\(2) \quad 4x - 9y &= 4\end{aligned}$$

2.4 Aufgabe 4

$$\begin{aligned}(1) \quad -3x + 5y &= -16 \\(2) \quad 3x - 9y &= 24\end{aligned}$$

¹Näheres zum Gleichsetzungsverfahren siehe hier: <http://www.dk4ek.de/lib/exe/fetch.php/lingl.pdf>

²Näheres zum Gauß-Jordan-Verfahren siehe hier: <http://www.dk4ek.de/lib/exe/fetch.php/gauss.pdf>

2.5 Aufgabe 5

$$\begin{aligned}(1) \quad & 5x - 2y + 3z = 19 \\(2) \quad & 2x + 2y - 4z = -6 \\(3) \quad & -2x + 3y + z = -12\end{aligned}$$

2.6 Aufgabe 6

$$\begin{aligned}(1) \quad & \frac{3}{2}x + \frac{2}{3}y - \frac{1}{3}z = -5 \\(2) \quad & \frac{3}{4}x - \frac{3}{2}y - \frac{1}{2}z = -\frac{45}{2} \\(3) \quad & -\frac{5}{2}x + \frac{5}{4}y - \frac{1}{9}z = \frac{43}{2}\end{aligned}$$

2.7 Aufgabe 7

$$\begin{aligned}(1) \quad & 0,5x + 3z - 4y = -15 \\(2) \quad & 2y - z + 3x = 14 \\(3) \quad & 0,7z + 8,8x - 2,6y = 7,2\end{aligned}$$

2.8 Aufgabe 8

$$\begin{aligned}(1) \quad & 2,3x + z = -6,6 \\(2) \quad & 5,8y + x = -13,6 \\(3) \quad & 2,3z + y = -6,6\end{aligned}$$

2.9 Aufgabe 9

$$\begin{aligned}(1) \quad & 3x - 2y + 4z = 6 \\(2) \quad & 5x + 2y - 3z = 4 \\(3) \quad & 3x + 4y - 7z = -2\end{aligned}$$

2.10 Aufgabe 10

$$\begin{aligned}(1) \quad & 3x - 5z = 1 \\(2) \quad & 3x - 4y = 3 \\(3) \quad & z - 2y = 4\end{aligned}$$

2.11 Aufgabe 11

$$\begin{aligned}(1) \quad & 5x - 4y + 6z = 7 \\(2) \quad & 2x + 3y - 2z = 4 \\(3) \quad & 9x + 2y + 2z = 12\end{aligned}$$

2.12 Aufgabe 12

$$\begin{aligned}(1) \quad & 3x - z + 2y = -4 \\(2) \quad & 3z - 2x + 5y = 12 \\(3) \quad & 5y - 5z + 3x = -20\end{aligned}$$

2.13 Aufgabe 13

$$\begin{aligned}(1) \quad & -5x + 3z = -14 \\(2) \quad & -4z + 2x + 3y = 13 \\(3) \quad & 3y + 5z = -12\end{aligned}$$

2.14 Aufgabe 14

$$\begin{aligned}(1) \quad & 4x + 3y + z = 0 \\(2) \quad & 3x + 4y + 5z = 0 \\(3) \quad & x - 2y + z = 0\end{aligned}$$

2.15 Aufgabe 15

$$\begin{aligned}(1) \quad & 2ax + ay + z = a \\(2) \quad & ax + 0,5by + bz = b^2 \\(3) \quad & ax + 2ay - 2bz = ab\end{aligned}$$

2.16 Aufgabe 16

$$\begin{aligned}(1) \quad & 5x - 3y + 4z = 1 \\(2) \quad & 2x + 4y - 2z = -14 \\(3) \quad & 3x - 5y + 3z = 3\end{aligned}$$

2.17 Aufgabe 17

$$\begin{aligned}(1) \quad & abx - 2aby + 2bz = 3ab \\(2) \quad & -2ax + 4by + 10z = a - 4b \\(3) \quad & 3bx - 6ay = 0\end{aligned}$$

3 Lösungen

3.1 Aufgabe 1

$$L = \{(3|-2)\}$$

3.2 Aufgabe 2

$$L = \{(-2|-3)\}$$

3.3 Aufgabe 3

$$L = \{(1|0)\}$$

3.4 Aufgabe 4

$$L = \{(2|-2)\}$$

3.5 Aufgabe 5

$$L = \{(2|-3|1)\}$$

3.6 Aufgabe 6

$$L = \{(-4|10|9)\}$$

3.7 Aufgabe 7

$$L = \{(2|4|0)\}$$

3.8 Aufgabe 8

$$L = \{(-2|-2|-2)\}$$

3.9 Aufgabe 9

$$L = \{(0|17|10)\}$$

3.10 Aufgabe 10

$$L = \{(-3|-3|-2)\}$$

3.11 Aufgabe 11

Das Gleichungssystem ist unstimmg, also *nicht* lösbar. Es gibt *keine einzige* Lösung.

3.12 Aufgabe 12

$$L = \{(0|0|4)\}$$

3.13 Aufgabe 13

$$L = \{(1|1| - 3)\}$$

3.14 Aufgabe 14

$$L = \{(0|0|0)\}$$

3.15 Aufgabe 15

$$L = \{(-b|2b|a)\}$$

3.16 Aufgabe 16

$$L = \{(-3|0|4)\}$$

3.17 Aufgabe 17

$$L = \left\{ \left(\frac{2a}{a-b} \mid \frac{b}{a-b} \mid \frac{a}{2} \right) \right\}$$

4 Komplette Lösungswege

Im Folgenden werden die Gleichungssysteme beispielhaft mit unterschiedlichen Lösungsmethoden gelöst.

4.1 Aufgabe 1

$$\begin{array}{l} (1) \quad 2x - 3y = 12 \\ (2) \quad 5x + 2y = 11 \end{array} \quad D = \mathbb{R}^2$$

Hier drängt sich einem kein bestimmtes Lösungsverfahren auf. Willkürlich wähle ich das Additions-/Subtraktionsverfahren.

Ich möchte y eliminieren. Daher multipliziere ich die erste Gleichung mit 2 und die zweite mit 3.

$$\begin{array}{r} (1) \quad 2x - 3y = 12 \quad | \cdot 2 \\ (2) \quad 5x + 2y = 11 \quad | \cdot 3 \\ \hline (1) \quad 4x - 6y = 24 \quad | \\ (2) \quad 15x + 6y = 33 \quad | + \\ \hline 19x \quad \quad = 57 \quad | : 19 \\ x = 3 \end{array}$$

Das Ergebnis setze ich in die erste Gleichung ein, um y zu bestimmen.

$$\begin{array}{l} 2x - 3y = 12 \\ 2 \cdot 3 - 3y = 12 \\ 6 - 3y = 12 \quad | - 6 \\ -3y = 6 \quad | : (-3) \\ y = -2 \end{array}$$

$$L = \{(3 | -2)\}$$

4.2 Aufgabe 2

$$\begin{aligned} (1) \quad 5x - 5y &= 5 \\ (2) \quad 5x + 4y &= -22 \end{aligned} \quad D = \mathbb{R}^2$$

Bei diesem Gleichungssystem muss man nicht lange nachdenken. Die Koeffizienten (Vorzeichen) von x sind gleich, daher bietet sich das Additions-/Subtraktionsverfahren an. Da die Vorzeichen gleich sind (positiv), muss subtrahiert werden. Ich subtrahiere die obere von der unteren Gleichung, damit y positiv bleibt.

$$\begin{array}{r} (1) \quad 5x - 5y = 5 \quad | - \\ (2) \quad 5x + 4y = -22 \quad | \\ \hline \quad 9y = -27 \quad | : 9 \\ \quad y = -3 \end{array}$$

Zur Bestimmung von x setze ich den Wert in die erste Gleichung ein.

$$\begin{array}{r} 5x - 5y = 5 \\ 5x - 5 \cdot (-3) = 5 \\ 5x + 15 = 5 \quad | - 15 \\ 5x = -10 \\ x = -2 \end{array}$$

$$L = \{(-3 | -2)\}$$

4.3 Aufgabe 3

$$\begin{aligned} (1) \quad -2x + 5y &= -2 \\ (2) \quad 4x - 9y &= 4 \end{aligned} \quad D = \mathbb{R}^2$$

Auch hier bietet sich das Additions-/Subtraktionsverfahren an, denn es muss nur die erste Gleichung mit 2 multipliziert werden, damit die Vorzeichen von x gleich sind.

$$\begin{array}{r} (1) \quad -2x + 5y = -2 \quad | \cdot 2 \\ (2) \quad 4x - 9y = 4 \\ \hline -4x + 10y = -4 \quad | \\ \quad 4x - 9y = 4 \quad | + \\ \hline \quad y = 0 \end{array}$$

Das ging flott. Zur Bestimmung von y setze ich den Wert in die erste Gleichung ein.

$$\begin{array}{r} -2x + 5y = -2 \\ -2x + 5 \cdot 0 = -2 \\ -2x = -2 \quad | : (-2) \\ x = 1 \end{array}$$

$$L = \{(1 | 0)\}$$

4.4 Aufgabe 4

$$\begin{array}{l} (1) \quad -3x + 5y = -16 \\ (2) \quad 3x - 9y = 24 \end{array} \quad D = \mathbb{R}^2$$

Auch bei diesem Gleichungssystem muss man nicht lange nachdenken. Die Koeffizienten (Vorzeichen) von x sind gleich, daher bietet sich das Additions-/Subtraktionsverfahren an. Da die Vorzeichen unterschiedlich sind, muss addiert werden. Ich subtrahiere die obere von der unteren Gleichung, damit y positiv bleibt.

$$\begin{array}{r} (1) \quad -3x + 5y = -16 \quad | \\ (2) \quad 3x - 9y = 24 \quad | + \\ \hline \quad \quad -4y = 8 \quad | : (-4) \\ \quad \quad y = -2 \end{array}$$

Das Ergebnis kann beispielsweise in Gleichung (2) eingesetzt werden.

$$\begin{array}{r} 3x - 9y = 24 \\ 3x - 9 \cdot (-2) = 24 \\ 3x + 18 = 24 \quad | - 18 \\ 3x = 6 \quad | : 3 \\ x = 2 \end{array}$$

$$L = \{(2 | -2)\}$$

4.5 Aufgabe 5

$$\begin{aligned} (1) \quad & 5x - 2y + 3z = 19 \\ (2) \quad & 2x + 2y - 4z = -6 \\ (3) \quad & -2x + 3y + z = -12 \quad D = \mathbb{R}^3 \end{aligned}$$

Da in Gleichung (3) die Variable z allein steht, wähle ich das Einsetzungsverfahren aus. Gleichung (3) wird nach z aufgelöst.

$$\begin{aligned} (3) \quad & -2x + 3y + z = -12 \quad | + 2x - 3y \\ (4) \quad & z = -12 + 2x - 3y \end{aligned}$$

Dieses Ergebnis wird in Gleichung (1) und Gleichung (2) eingesetzt.

$$\begin{array}{r} (1) \quad 5x - 2y + 3z = 19 \\ (2) \quad 2x + 2y - 4z = -6 \\ \hline (1a) \quad 5x - 2y + 3 \cdot (-12 + 2x - 3y) = 19 \\ (2a) \quad 2x + 2y - 4 \cdot (-12 + 2x - 3y) = -6 \\ \hline (1a) \quad 5x - 2y - 36 + 6x - 9y = 19 \quad | + 36 \\ (2a) \quad 2x + 2y + 48 - 8x + 12y = -6 \quad | - 48 \\ \hline (1a) \quad 11x - 11y = 55 \\ (2a) \quad -6x + 14y = -54 \end{array}$$

Damit haben wir das Gleichungssystem auf ein System 2. Ordnung reduziert. Für den nächsten Reduktionsschritt verwende ich erneut das Einsetzungsverfahren, da Gleichung (1a) gut durch 11 dividiert werden kann.

$$\begin{aligned} (1a) \quad & 11x - 11y = 55 \quad | : 11 \\ & x - y = 5 \quad | + y \\ (5) \quad & x = 5 + y \end{aligned}$$

Das Ergebnis wird in Gleichung (2a) eingesetzt.

$$\begin{aligned} (2a) \quad & -6x + 14y = -54 \\ & -6 \cdot (5 + y) + 14y = -54 \\ & -30 - 6y + 14y = -54 \quad | + 30 \\ & 8y = -24 \quad | : 8 \\ & y = -3 \end{aligned}$$

Das Ergebnis wird in Gleichung (5) eingesetzt.

$$\begin{aligned} x &= 5 + y \\ x &= 5 - 3 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

Beide Ergebnisse werden in Gleichung (4) eingesetzt.

$$\begin{aligned} z &= -12 + 2x - 3y \\ z &= -12 + 2 \cdot 2 - 3 \cdot (-3) \\ z &= -12 + 4 + 9 \\ z &= 1 \end{aligned}$$

$$L = \{(2 | -3 | 1)\}$$

4.6 Aufgabe 6

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \frac{3}{2}x + \frac{2}{5}y - \frac{1}{3}z = -5 \\
 (2) \quad & \frac{3}{4}x - \frac{3}{2}y - \frac{1}{2}z = -\frac{45}{2} \\
 (3) \quad & -\frac{5}{2}x + \frac{5}{4}y - \frac{1}{9}z = \frac{43}{2} \qquad D = \mathbb{R}^3
 \end{aligned}$$

Mit diesen Brüchen lässt sich schlecht rechnen. Daher wird jede Gleichung zunächst mit ihrem Hauptnenner multipliziert.

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \frac{3}{2}x + \frac{2}{5}y - \frac{1}{3}z = -5 \quad | \cdot 30 \\
 (2) \quad & \frac{3}{4}x - \frac{3}{2}y - \frac{1}{2}z = -\frac{45}{2} \quad | \cdot 4 \\
 (3) \quad & -\frac{5}{2}x + \frac{5}{4}y - \frac{1}{9}z = \frac{43}{2} \quad | \cdot 36 \\
 \hline
 (1a) \quad & 45x + 12y - 10z = -150 \\
 (2a) \quad & 3x - 6y - 2z = -90 \\
 (3a) \quad & -90x + 45y - 4z = 774
 \end{aligned}$$

Dieses Gleichungssystem löse ich mit der **Cramerschen Regel**.

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\begin{vmatrix} -150 & 12 & -10 \\ -90 & -6 & -2 \\ 774 & 45 & -4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 45 & 12 & -10 \\ 3 & -6 & -2 \\ -90 & 45 & -4 \end{vmatrix}} \\
 &= \frac{-3\,600 - 18\,576 + 40\,500 - 46\,440 - 13\,500 - 4\,320}{1\,080 + 2\,160 - 1\,350 + 5\,400 + 4\,050 + 144 - 45\,936} \\
 &= \frac{11\,484}{-4} \\
 x &= -4
 \end{aligned}$$

Da bei der Berechnung von y der gleiche Nenner auftritt, kann dort sofort der Zahlenwert 11 484 eingesetzt werden.

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{\begin{vmatrix} 45 & -150 & -10 \\ 3 & -90 & -2 \\ -90 & 774 & -4 \end{vmatrix}}{11\,484} \\
 &= \frac{16\,200 - 27\,000 - 23\,220 + 81\,000 + 69\,660 - 1\,800}{11\,484} \\
 &= \frac{114\,840}{11\,484} \\
 y &= 10
 \end{aligned}$$

Die Variable z wird am besten durch Einsetzen der ersten beiden Lösungen in eine der Gleichung bestimmt. Hierzu wähle ich Gleichung (2a) aus.

$$\begin{aligned} 3x - 6y - 2z &= -90 && | -3x + 6y \\ -2z &= -90 - 3x + 6y \\ -2z &= -90 - 3 \cdot (-4) + 6 \cdot 10 \\ -2z &= -90 + 12 + 60 \\ -2z &= -18 && | : (-2) \\ z &= 9 \end{aligned}$$

$$L = \{(-4|10|9)\}$$

4.7 Aufgabe 7

$$\begin{array}{l}
 (1) \quad 0,5x + 3z - 4y = -15 \\
 (2) \quad 2y - z + 3x = 14 \\
 (3) \quad 0,7z + 8,8x - 2,6y = 7,2 \quad D = \mathbb{R}^3
 \end{array}$$

Zur Abwechslung nehme ich für den ersten Reduktionsschritt das Einsetzungsverfahren, da sich Gleichung (2) leicht nach z umstellen lässt.

$$\begin{array}{l}
 (2) \quad 2y - z + 3x = 14 \quad | -2y - 3x \\
 \quad \quad -z = 14 - 2y - 3x \quad | : (-1) \\
 (4) \quad \quad \quad z = -14 + 2y + 3x
 \end{array}$$

Das Ergebnis wird in Gleichung (1) und in Gleichung (3) eingesetzt.

$$\begin{array}{l}
 (1) \quad 0,5x + 3z - 4y = -15 \\
 (3) \quad 0,7z + 8,8x - 2,6y = 7,2 \\
 \hline
 (1a) \quad 0,5x + 3 \cdot (-14 + 2y + 3x) - 4y = -15 \\
 (3a) \quad 0,7 \cdot (-14 + 2y + 3x) + 8,8x - 2,6y = 7,2 \\
 \hline
 (1a) \quad 0,5x - 42 + 6y + 9x - 4y = -15 \quad | +42 \\
 (3a) \quad -9,8 + 1,4y + 2,1x + 8,8x - 2,6y = 7,2 \quad | +9,8 \\
 \hline
 (1a) \quad 9,5x + 2y = 27 \\
 (3a) \quad 10,9x - 1,2y = 17
 \end{array}$$

Damit ist der erste Reduktionsschritt fertig, wir haben ein Gleichungssystem von nur noch 2. Ordnung erhalten. Für die weitere Lösung verwende ich die Cramersche Regel.

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\begin{vmatrix} 27 & 2 \\ 17 & -1,2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 9,5 & 2 \\ 10,9 & -1,2 \end{vmatrix}} \\
 &= \frac{-32,4 - 34}{-11,4 - 21,8} \\
 &= \frac{-66,4}{-33,2} \\
 x &= 2
 \end{aligned}$$

Das Ergebnis wird in Gleichung (1a) eingesetzt.

$$\begin{array}{l}
 9,5x + 2y = 27 \\
 9,5 \cdot 2 + 2y = 27 \\
 19 + 2y = 27 \quad | -19 \\
 2y = 8 \quad | :2 \\
 y = 4
 \end{array}$$

Beide Ergebnisse werden in Gleichung (4) eingesetzt.

$$\begin{array}{l}
 z = -14 + 2y + 3x \\
 z = -14 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 2 \\
 z = 0
 \end{array}$$

$$L = \{(2|4|0)\}$$

4.8 Aufgabe 8

$$\begin{aligned}(1) \quad 2,3x + z &= -6,6 \\(2) \quad 5,8y + x &= -13,6 \\(3) \quad 2,3z + y &= -6,6 \quad D = \mathbb{R}^3\end{aligned}$$

Zunächst bringe ich das Gleichungssystem in die Normalform.

$$\begin{aligned}(1) \quad 2,3x & \quad \quad \quad +z &= -6,6 \\(2) \quad x + 5,8y & & &= -13,6 \\(3) \quad & y + 2,3z &= -6,6\end{aligned}$$

Wegen der vielen Lücken bietet sich die Cramersche Regel zur Lösung an.

$$\begin{aligned}x &= \frac{\begin{vmatrix} -6,6 & 0 & 1 \\ -13,6 & 5,8 & 0 \\ -6,6 & 1 & 2,3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2,3 & 0 & 1 \\ 1 & 5,8 & 0 \\ 0 & 1 & 2,3 \end{vmatrix}} \\ &= \frac{-88,044 + 0 - 13,6 + 38,28 - 0 - 0}{30,682 + 0 + 1 - 0 - 0 - 0} \\ &= \frac{-63,364}{31,682} \\ x &= -2\end{aligned}$$

Das Ergebnis kann zur Bestimmung von z in Gleichung (1) eingesetzt werden.

$$\begin{aligned}2,3x + z &= -6,6 \\2,3 \cdot (-2) + z &= -6,6 \\-4,6 + z &= -6,6 \quad | + 4,6 \\z &= -2\end{aligned}$$

Das Ergebnis kann zur Bestimmung von y in Gleichung (3) eingesetzt werden.

$$\begin{aligned}2,3z + y &= -6,6 \\2,3 \cdot (-2) + y &= -6,6 \\-4,6 + y &= -6,6 \quad | + 4,6 \\y &= -2\end{aligned}$$

$$L = \{(-2 | -2 | -2)\}$$

4.9 Aufgabe 9

$$\begin{array}{l} (1) \quad 3x - 2y + 4z = 6 \\ (2) \quad 5x + 2y - 3z = 4 \\ (3) \quad 3x + 4y - 7z = -2 \end{array} \quad D = \mathbb{R}^3$$

Zur Abwechslung verwende ich hier das Additions-/Subtraktionsverfahren. Ich will im ersten Reduktionsschritt die Variable y eliminieren. Dazu addiere ich zunächst Gleichung (1) mit (2).

$$\begin{array}{l} (1) \quad 3x \quad -2y \quad +4z = 6 \quad | \\ (2) \quad 5x \quad +2y \quad -3z = 4 \quad | + \\ \hline (4) \quad 8x \quad \quad \quad +z = 10 \end{array}$$

Anschließend verdopple ich Gleichung (1), damit ich sie zu Gleichung (3) addieren kann.

$$\begin{array}{l} (1) \quad 3x \quad -2y \quad +4z = 6 \quad | \cdot 2 \\ (3) \quad 3x \quad +4y \quad -7z = -2 \\ \hline (1) \quad 6x \quad -4y \quad +8z = 12 \quad | \\ (3) \quad 3x \quad +4y \quad -7z = -2 \quad | + \\ \hline (5) \quad 9x \quad \quad \quad +z = 10 \end{array}$$

Mit Gleichung (4) und (5) haben wir nun ein Gleichungssystem von nur noch 2. Ordnung. Es bietet sich an, die Gleichungen voneinander zu subtrahieren.

$$\begin{array}{l} (4) \quad 8x \quad +z = 10 \quad | - \\ (5) \quad 9x \quad +z = 10 \quad | \\ \hline \quad \quad x \quad \quad = 0 \end{array}$$

Das Ergebnis wird in Gleichung (4) eingesetzt, um y zu bestimmen.

$$\begin{array}{l} 8x + z = 10 \\ 8 \cdot 0 + z = 10 \\ z = 10 \end{array}$$

Beide Ergebnisse werden in Gleichung (1) eingesetzt.

$$\begin{array}{l} 3x - 2y + 4z = 6 \\ 3 \cdot 0 - 2y + 4 \cdot 10 = 6 \\ -2y + 40 = 6 \quad | - 40 \\ -2y = -34 \quad | : (-2) \\ y = 17 \end{array}$$

$$L = \{(0|17|10)\}$$

4.10 Aufgabe 10

$$\begin{array}{l} (1) \quad 3x - 5z = 1 \\ (2) \quad 3x - 4y = 3 \\ (3) \quad z - 2y = 4 \end{array} \quad D = \mathbb{R}^3$$

Dieses Gleichungssystem sollte zunächst in die Normalform gebracht werden, damit es übersichtlicher wird.

$$\begin{array}{l} (1) \quad 3x \quad \quad -5z = 1 \\ (2) \quad 3x \quad -4y \quad \quad = 3 \\ (3) \quad \quad -2y \quad +z = 4 \end{array}$$

Es bietet sich das Additions-/Subtraktionsverfahren an. Man kann Gleichung (3) mit 2 multiplizieren und von Gleichung (2) subtrahieren, damit y wegfällt.

$$\begin{array}{r} (2) \quad 3x \quad -4y \quad \quad = 3 \\ (3) \quad \quad -2y \quad +z = 4 \quad | \cdot 2 \\ \hline (2) \quad 3x \quad -4y \quad \quad = 3 \quad | \\ (3) \quad \quad -4y \quad +2z = 8 \quad | - \\ \hline (4) \quad 3x \quad \quad -2z = -5 \end{array}$$

Übrig bleiben zwei Gleichungen mit nur noch zwei Variablen. Es ist zweckmäßig, die Gleichungen sofort voneinander zu subtrahieren.

$$\begin{array}{r} (1) \quad 3x \quad -5z = 1 \quad | \\ (4) \quad 3x \quad -2z = -5 \quad | - \\ \hline (5) \quad \quad -3z = 6 \quad | : (-3) \\ \quad \quad \quad z = -2 \end{array}$$

Das Ergebnis setze ich in (1) ein.

$$\begin{array}{r} 3x - 5z = 1 \\ 3x - 5 \cdot (-2) = 1 \\ 3x + 10 = 1 \quad | - 10 \\ 3x = -9 \quad | : 3 \\ x = -3 \end{array}$$

Dieses Ergebnis kann in (2) eingesetzt werden.

$$\begin{array}{r} 3x - 4y = 3 \\ 3 \cdot (-3) - 4y = 3 \\ -9 - 4y = 3 \quad | + 9 \\ -4y = 12 \quad | : (-4) \\ y = -3 \end{array}$$

$$L = \{(-3 | -3 | -2)\}$$

4.11 Aufgabe 11

$$\begin{aligned} (1) \quad 5x - 4y + 6z &= 7 \\ (2) \quad 2x + 3y - 2z &= 4 \\ (3) \quad 9x + 2y + 2z &= 12 \end{aligned} \quad D = \mathbb{R}^3$$

Lösungsvariante 1: Es liegen keinerlei Besonderheiten vor und das Gleichungssystem ist schon in Normalform angegeben. Daher verwende ich die **Cramersche Regel** zur Lösung.

$$\begin{aligned} x &= \frac{\begin{vmatrix} 7 & -4 & 6 \\ 4 & 3 & -2 \\ 12 & 2 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & -4 & 6 \\ 2 & 3 & -2 \\ 9 & 2 & 2 \end{vmatrix}} \\ &= \frac{42 + 96 + 48 - 216 + 28 + 32}{30 + 72 + 24 - 162 + 20 + 16} \\ &= \frac{30}{0} \end{aligned}$$

Die Nennerdeterminante ist Null! Das bedeutet, das Gleichungssystem ist **unterbestimmt**, es gibt daher keine Lösung.

Lösungsvariante 2: Um zu zeigen, dass auch andere Lösungsverfahren nicht zu einem Ergebnis führen, verwende ich für einen zweiten Lösungsversuch das Additions-/Subtraktionsverfahren.

Zunächst fasse ich Gleichung (2) und (3) zu einer Gleichung zusammen, die ich (4) nenne.

$$\begin{array}{r} (2) \quad 2x + 3y - 2z = 4 \quad | \\ (3) \quad 9x + 2y + 2z = 12 \quad | + \\ \hline (4) \quad 11x + 5y = 16 \end{array}$$

Aus Gleichung (1) und (2) mache ich eine Gleichung (5).

$$\begin{array}{r} (1) \quad 5x - 4y + 6z = 7 \\ (2) \quad 2x + 3y - 2z = 4 \quad | \cdot 3 \\ \hline (1) \quad 5x - 4y + 6z = 7 \quad | \\ (2) \quad 6x + 9y - 6z = 12 \quad | + \\ \hline (5) \quad 11x + 5y = 19 \end{array}$$

Vergleicht man nun diese beiden Gleichungen, dann fällt sofort auf, dass die linken Seiten identisch sind, auf der rechten Seite aber eine andere Zahl steht. Damit ist das Gleichungssystem **nicht lösbar**.

Lösungsvariante 3: Um zu zeigen, wie sich die Unlösbarkeit bei anderen Verfahren darstellt, setze ich jetzt eine Lösung mit dem **Einsetzungsverfahren** an.

$$\begin{aligned} (1) \quad & 5x - 4y + 6z = 7 \\ (2) \quad & 2x + 3y - 2z = 4 \\ (3) \quad & 9x + 2y + 2z = 12 \end{aligned}$$

Ich löse Gleichung (2) nach x auf und setze das Ergebnis in die anderen Gleichungen ein.

$$\begin{array}{rcl} 2x + 3y - 2z & = & 4 \qquad \qquad \qquad | - 3y + 2z \\ 2x & = & 4 - 3y + 2z \quad | : 2 \\ x & = & 2 - \frac{3}{2}y + z \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{in (1)} & 5 \cdot \left(2 - \frac{3}{2}y + z\right) - 4y + 6z & = 7 \\ \text{in (3)} & 9 \cdot \left(2 - \frac{3}{2}y + z\right) + 2y + 2z & = 12 \\ \hline (1) & 10 - \frac{15}{2}y + 5z - 4y + 6z & = 7 \quad | - 10 \\ (3) & 18 - \frac{27}{2}y + 9z + 2y + 2z & = 12 \quad | - 18 \\ \hline (1) & & -\frac{23}{2}y + 11z = -3 \\ (3) & & -\frac{23}{2}y + 11z = -6 \\ \hline \end{array}$$

Auch hier haben wir wieder zwei Gleichungen erhalten, die auf der linken Seite identisch sind, auf der rechten Seite aber unterschiedliche Ergebnisse liefern sollen. Da das nicht sein kann, ist das Gleichungssystem **unlösbar**.

4.12 Aufgabe 12

$$\begin{aligned}(1) \quad 3x - z + 2y &= -4 \\(2) \quad 3z - 2x + 5y &= 12 \\(3) \quad 5y - 5z + 3x &= -20 \quad D = \mathbb{R}^3\end{aligned}$$

Zunächst sollte das Gleichungssystem durch Sortieren in die Normalform gebracht werden.

$$\begin{aligned}(1) \quad 3x + 2y - z &= -4 \\(2) \quad -2x + 5y + 3z &= 12 \\(3) \quad 3x + 5y - 5z &= -20\end{aligned}$$

Zur Abwechslung verwende ich hier das Einsetzungsverfahren. Gleichung (1) kann gut nach z umgestellt werden.

$$\begin{aligned}3x + 2y - z &= -4 && | -3x - 3y \\-z &= -4 - 3x - 3y && | \cdot (-1) \\z &= 4 + 3x + 3y\end{aligned}$$

Das Ergebnis wird in (2) und in (3) eingesetzt.

$$\begin{array}{rcl} (2) & -2x + 5y + 3 \cdot (4 + 3x + 3y) & = 12 \\ (3) & 3x + 5y - 5 \cdot (4 + 3x + 3y) & = -20 \\ \hline (2) & -2x + 5y + 12 + 9x + 9y & = 12 & | -12 \\ (3) & 3x + 5y - 20 - 15x - 15y & = -20 & | +20 \\ \hline (2) & & 7x + 14y & = 0 \\ (3) & & -12x - 10y & = 0 \\ \hline \end{array}$$

Gleichung (2) kann gut nach x umgestellt werden.

$$\begin{aligned}7x + 14y &= 0 && | -14y \\7x &= -14y && | :7 \\x &= -2y\end{aligned}$$

Das Ergebnis wird in (3) eingesetzt.

$$\begin{aligned}-12x - 10y &= 0 \\-12 \cdot (-2y) - 10y &= 0 \\24y - 10y &= 0 \\14y &= 0 && | :14 \\y &= 0\end{aligned}$$

Das Ergebnis wird in die umgestellte Gleichung (2) eingesetzt.

$$x = -2y = -2 \cdot 0 = 0$$

Beide Ergebnisse werden in die umgestellte Gleichung (1) eingesetzt.

$$z = 4 + 3x + 3y = z = 4 + 3 \cdot 0 + 3 \cdot 0 = 4$$

Die Lösungsmenge lautet: $L = \{(0|0|4)\}$

4.13 Aufgabe 13

$$\begin{array}{l} (1) \quad -5x + 3z = -19 \\ (2) \quad -4z + 2x + 3y = 19 \\ (3) \quad 3y + 5z = -12 \end{array} \quad D = \mathbb{R}^3$$

Auch dieses Gleichungssystem sollte zunächst „geordnet“ werden, damit man es besser überblickt.

$$\begin{array}{l} (1) \quad -5x \quad \quad +3z = -14 \\ (2) \quad -2x \quad +3y \quad -4z = 13 \\ (3) \quad \quad \quad 3y \quad +5z = -12 \end{array}$$

Es fällt auf, dass die Koeffizienten von y in Gleichung (2) und (3) übereinstimmen. Zudem fehlt in Gleichung (1) y ganz. Daher bietet es sich an, die Gleichungen (2) und (3) voneinander zu subtrahieren.

$$\begin{array}{l} (2) \quad -2x \quad +3y \quad -4z = 13 \quad | \\ (3) \quad \quad \quad 3y \quad +5z = -12 \quad |- \\ \hline (4) \quad -2x \quad \quad \quad -9z = 25 \end{array}$$

Übrig bleiben Gleichung (1) und (4) als Lineargleichungssystem 2. Ordnung.

$$\begin{array}{l} (1) \quad -5x \quad +3z = -14 \\ (4) \quad -2x \quad -9z = 25 \end{array}$$

Auch für den nächsten Reduktionsschritt bietet sich das Additionsverfahren an. Wenn vor dem Addieren (1) mit 3 multipliziert wird, fällt z weg.

$$\begin{array}{l} (1) \quad -5x \quad +3z = -14 \quad | \cdot 3 \\ (4) \quad -2x \quad -9z = 25 \\ \hline (1) \quad -15x \quad +9z = -42 \quad | \\ (4) \quad -2x \quad -9z = 25 \quad | + \\ \hline \quad \quad -17x \quad \quad = -17 \quad | : (-17) \\ \quad \quad \quad x \quad \quad = 1 \end{array}$$

Das Ergebnis wird in Gleichung (1) eingesetzt.

$$\begin{array}{l} -5x + 3z = -14 \\ -5 \cdot 1 + 3z = -14 \quad | + 5 \\ \quad \quad 3z = -9 \quad | : 3 \\ \quad \quad \quad z = -3 \end{array}$$

Das Ergebnis wird in Gleichung (3) eingesetzt.

$$\begin{array}{l} 3y + 5z = -12 \\ 3y + 5 \cdot (-3) = -12 \\ \quad \quad 3y - 15 = -12 \quad | + 15 \\ \quad \quad \quad 3y = 3 \quad | : 3 \\ \quad \quad \quad \quad y = 1 \end{array}$$

Die Lösungsmenge lautet: $L = \{(1|1|-3)\}$

4.14 Aufgabe 14

$$\begin{aligned}(1) \quad 4x + 3y + z &= 0 \\(2) \quad 3x + 4y + 5z &= 0 \\(3) \quad x - 2y + z &= 0\end{aligned} \quad D = \mathbb{R}^3$$

Da sich kein Verfahren besonders „aufdrängt“, verwende ich die Cramersche Regel.

$$\begin{aligned}x &= \frac{\begin{vmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 5 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix}} \\ &= \frac{0 + 0 + 0 - 0 - 0 - 0}{16 + 15 - 6 - 4 + 40 - 9} \\ &= \frac{0}{52} \\ x &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y &= \frac{\begin{vmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{52} \\ &= \frac{0 + 0 + 0 - 0 - 0 - 0}{52} \\ &= \frac{0}{52} \\ y &= 0\end{aligned}$$

Eingesetzt in (1):

$$\begin{aligned}4x + 3y + z &= 0 \\ 4 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + z &= 0 \\ z &= 0\end{aligned}$$

Die Lösungsmenge lautet: $L = \{(0|0|0)\}$

4.15 Aufgabe 15

$$\begin{aligned} (1) \quad 2ax + ay + z &= a \\ (2) \quad ax + 0,5by + bz &= b^2 \\ (3) \quad ax + 2ay - 2bz &= ab \end{aligned} \quad D = \mathbb{R}^3$$

Eine Besonderheit liegt hier darin, dass die Gleichungen neben den **Variablen** x , y und z auch die **Parameter** a , b und c enthalten.

Zur Lösung möchte ich das Additions-/Subtraktionsverfahren verwenden. Dazu multipliziere ich die Gleichungen (2) und (3) jeweils mit 2.

$$\begin{aligned} (1) \quad 2ax + ay + z &= a \\ (2) \quad 2ax + by + 2bz &= 2b^2 \\ (3) \quad 2ax + 4ay - 4bz &= 2ab \end{aligned}$$

Gleichung (2) wird von Gleichung (1) subtrahiert:

$$\begin{array}{rcll} (1) & 2ax & +ay & +z & = & a & | \\ (2) & 2ax & +by & +2bz & = & 2b^2 & | - \\ \hline (4) & & ay - by & +z - 2bz & = & a - 2b^2 & \\ (4) & & (a - b) \cdot y & +(1 - 2b) \cdot z & = & a - 2b^2 & \end{array}$$

Als nächstes muss auch noch Gleichung (3) mitverwendet werden. Ich subtrahiere daher Gleichung (3) von (1).

$$\begin{array}{rcll} (1) & 2ax & +ay & +z & = & a & | \\ (3) & 2ax & +4ay & -4bz & = & 2ab & | - \\ \hline (5) & & ay - 4ay & +z + 4bz & = & a - 2ab & \\ (5) & & -3a \cdot y & +(1 + 4b) \cdot z & = & a - 2ab & \end{array}$$

Damit ist das Gleichungssystem 3. Ordnung reduziert auf ein Gleichungssystem 2. Ordnung.

$$\begin{aligned} (4) \quad (a - b) \cdot y + (1 - 2b) \cdot z &= a - 2b^2 \\ (5) \quad -3a \cdot y + (1 + 4b) \cdot z &= a - 2ab \end{aligned}$$

Es steht uns für den nächsten Reduktionsschritt wieder frei, welches Verfahren wir anwenden wollen. Ich entscheide mich für das Einsetzungsverfahren und löse Gleichung (5) nach y auf.

$$\begin{aligned} -3a \cdot y + (1 + 4b) \cdot z &= a - 2ab & | - (1 + 4b) \cdot z \\ -3a \cdot y &= a - 2ab - (1 + 4b) \cdot z & | : (-3a) \\ y &= -\frac{1}{3} + \frac{2b}{3} + \frac{(1 + 4b) \cdot z}{3a} \end{aligned}$$

Dieser Term wird für y in Gleichung (4) eingesetzt:

$$(a - b) \cdot \left(-\frac{1}{3} + \frac{2b}{3} + \frac{(1 + 4b) \cdot z}{3a} \right) + (1 - 2b) \cdot z = a - 2b^2$$

Hat man Brüche in einer Gleichung, empfiehlt es sich immer, die Gleichung **sofort** mit dem Hauptnenner zu multiplizieren. Dann verschwinden alle Brüche. Hier ist er Hauptnenner $3a$.

$$\begin{aligned}
 (a-b) \cdot \left(-\frac{1}{3} + \frac{2b}{3} + \frac{(1+4b) \cdot z}{3a} \right) + (1-2b) \cdot z &= a - 2b^2 & | \cdot 3a \\
 (a-b) \cdot (-a + 2ab + (1+4b) \cdot z) + (1-2b) \cdot 3az &= 3a^2 - 6ab^2 \\
 (a-b) \cdot (-a + 2ab + z + 4bz) + 3az - 6abz &= 3a^2 - 6ab^2 \\
 -a^2 + 2a^2b + az + 4abz + ab - 2ab^2 - bz + 4b^2z + 3az - 6abz &= 3a^2 - 6ab^2
 \end{aligned}$$

Nun werden alle Terme, die z enthalten, auf die linke Seite sortiert (da sind sie schon), und alle Terme, die **kein** z enthalten, auf die rechte Seite.

$$\begin{aligned}
 -a^2 + 2a^2b + az + 4abz + ab - 2ab^2 - bz + 4b^2z + 3az - 6abz &= 3a^2 - 6ab^2 \\
 4az - 2abz - bz - 4b^2z &= 4a^2 - 2a^2b - ab - 4ab^2 \\
 (4a - 2ab - b - 4b^2) \cdot z &= 4a^2 - 2a^2b - ab - 4ab^2 \\
 z &= \frac{4a^2 - 2a^2b - ab - 4ab^2}{4a - 2ab - b - 4b^2} \\
 z &= \frac{a \cdot (4a - 2ab - b - 4b^2)}{4a - 2ab - b - 4b^2} \\
 z &= a
 \end{aligned}$$

Dieses Ergebnis kann nun in die umgestellte Gleichung (5) eingesetzt werden, um y zu erhalten.

$$\begin{aligned}
 y &= -\frac{1}{3} + \frac{2b}{3} + \frac{(1+4b) \cdot z}{3a} \\
 &= -\frac{1}{3} + \frac{2b}{3} + \frac{(1+4b) \cdot a}{3a} \\
 &= -\frac{1}{3} + \frac{2b}{3} + \frac{1+4b}{3} \\
 &= \frac{-1 + 2b + 1 + 4b}{3} \\
 &= \frac{6b}{3} \\
 y &= 2b
 \end{aligned}$$

Jetzt fehlt nur noch x . Das kann durch Einsetzen der bekannten Werte in (1), (2) oder (3) bestimmt werden. Willkürlich wähle ich dazu Gleichung (3) aus.

$$\begin{aligned}
 ax + 2ay - 2bz &= ab \\
 ax + 2a \cdot 2b - 2b \cdot a &= ab \\
 ax + 4ab - 2ab &= ab \\
 ax + 2ab &= ab & | - 2ab \\
 ax &= -ab & | : a \\
 x &= -b
 \end{aligned}$$

Hiermit kann die Lösungsmenge angegeben werden: $L = \{(-b|2b|a)\}$

4.16 Aufgabe 16

$$\begin{aligned}(1) \quad 5x - 3y + 4z &= 1 \\(2) \quad 2x + 4y - 2z &= -14 \\(3) \quad 3x - 5y + 3z &= 3\end{aligned} \quad D = \mathbb{R}^3$$

Hier haben wir wieder keine Besonderheit, die für Einsetz- oder Additions-/Subtraktionsverfahren spricht. Deshalb verwende ich der Einfachheit halber die Cramersche Regel.

$$\begin{aligned}x &= \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3 & 4 \\ -14 & 4 & -2 \\ 3 & -5 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & -3 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \\ 3 & -5 & 3 \end{vmatrix}} \\ &= \frac{12 + 18 + 280 - 48 - 10 - 126}{60 + 18 - 40 - 48 - 50 + 18} \\ &= \frac{126}{-42} \\ x &= -3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y &= \frac{\begin{vmatrix} 5 & 1 & 4 \\ 2 & -14 & -2 \\ 3 & 3 & 3 \end{vmatrix}}{52} \\ &= \frac{-210 - 6 + 24 + 168 + 30 - 6}{-42} \\ &= \frac{0}{-42} \\ y &= 0\end{aligned}$$

Eingesetzt in (1):

$$\begin{aligned}5x - 3y + 4z &= 1 \\ 5 \cdot (-3) - 3 \cdot 0 + 4z &= 1 \\ -15 + 4z &= 1 \quad | +15 \\ 4z &= 16 \quad | :4 \\ z &= 4\end{aligned}$$

Die Lösungsmenge lautet: $L = \{(-3|0|4)\}$

4.17 Aufgabe 17

$$\begin{array}{rcl}
 (1) & abx - 2aby + 2bz & = 3ab \\
 (2) & -2ax + 4by + 10z & = a - 4b \\
 (3) & 3bx - 6ay & = 0
 \end{array} \quad D = \mathbb{R}^3$$

Bei diesem Gleichungssystem fällt auf, dass Gleichung (3) kein z enthält. Also sollte man Gleichung (1) und (2) so kombinieren, dass dort auch z wegfällt. Das geht am besten mit dem Additions-/Subtraktionsverfahren.

$$\begin{array}{rcl}
 (1) & abx & -2aby + 2bz = 3ab & | \cdot 5 \\
 (2) & -2ax & +4by + 10z = a - 4b & | \cdot b \\
 \hline
 (1) & 5abx & -10aby + 10bz = 15ab & | \\
 (2) & -2abx & +4b^2y + 10bz = ab - 4b^2 & | - \\
 \hline
 (4) & 7abx & -10aby - 4b^2y & = 14ab + 4b^2
 \end{array}$$

Wir haben die Gleichungen (3) und (4) zur Weiterbearbeitung, die jetzt nur noch die Variablen x und y enthalten.

$$\boxed{
 \begin{array}{rcl}
 (3) & 3bx & -6ay = 0 \\
 (4) & 7abx & -10aby - 4b^2y = 14ab + 4b^2
 \end{array}
 }$$

Für den nächsten Reduktionsschritt verwende ich wieder das Additions-/Subtraktionsverfahren, da die Parameter von x relativ einfach gleich gemacht werden können.

$$\begin{array}{rcl}
 (3) & 3bx & -6ay = 0 & | \cdot 7a \\
 (4) & 7abx & -10aby - 4b^2y = 14ab + 4b^2 & | \cdot 3 \\
 \hline
 (3) & 21abx & -42a^2y = 0 & | \\
 (4) & 21abx & -30aby - 12b^2y = 42ab + 12b^2 & | - \\
 \hline
 & & -42a^2y + 30aby + 12b^2y & = -42ab - 12b^2
 \end{array}$$

Diese Gleichung muss nun nach y umgestellt werden.

$$\begin{aligned}
 -42a^2y + 30aby + 12b^2y &= -42ab - 12b^2 \\
 (-42a^2 + 30ab + 12b^2) \cdot y &= -42ab - 12b^2 & | : (-42a^2 + 30ab + 12b^2) \\
 y &= \frac{-42ab - 12b^2}{-42a^2 + 30ab + 12b^2}
 \end{aligned}$$

Man kann nun versuchen, im Zähler und Nenner möglichst viel auszuklammern, damit ein Kürzen möglich wird.

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{-42ab - 12b^2}{-42a^2 + 30ab + 12b^2} \\
 y &= \frac{(-7a - 2b) \cdot 6b}{(-7a^2 + 5ab + 2b^2) \cdot 6} \\
 y &= \frac{(-7a - 2b) \cdot b}{-7a^2 + 5ab + 2b^2}
 \end{aligned}$$

Auf den ersten Blick geht es hier nicht weiter. Mit Hilfe einer Polynomdivision kann man prüfen, ob eventuell der Faktor $(-7a - 2b)$ des Zählers auch als Faktor im Nenner enthalten ist.

$$\begin{array}{r} (-7a^2 + 5ab + 2b^2) : (-7a - 2b) = a - b \\ -(-7a^2 - 2ab) \\ \hline 7ab + 2b^2 \\ - (7ab + 2b^2) \\ \hline 0 \end{array}$$

Hiermit kann der Nenner faktorisiert werden, man kann kürzen.

$$\begin{aligned} y &= \frac{(-7a - 2b) \cdot b}{-7a^2 + 5ab + 2b^2} \\ &= \frac{(-7a - 2b) \cdot b}{(-7a - 2b) \cdot (a - b)} \\ y &= \frac{b}{a - b} \end{aligned}$$

Durch Einsetzen in Gleichung (3) kann nun x bestimmt werden.

$$\begin{aligned} 3bx - 6ay &= 0 \\ 3bx - 6a \cdot \frac{b}{a - b} &= 0 \\ 3bx - \frac{6ab}{a - b} &= 0 \quad | + \frac{6ab}{a - b} \\ 3bx &= \frac{6ab}{a - b} \quad | : 3b \\ x &= \frac{2a}{a - b} \end{aligned}$$

Zur Bestimmung von z setze ich die gefundenen Werte in Gleichung (1) ein.

$$\begin{aligned} abx - 2aby + 2bz &= 3ab \\ ab \cdot \frac{2a}{a - b} - 2ab \cdot \frac{b}{a - b} + 2bz &= 3ab \\ \frac{2a^2b}{a - b} - \frac{2ab^2}{a - b} + 2bz &= 3ab \quad | \cdot (a - b) \\ 2a^2b - 2ab^2 + 2abz - 2b^2z &= 3a^2b - 3ab^2 \quad | - 2a^2b + 2ab^2 \\ 2abz - 2b^2z &= a^2b - ab^2 \\ (2ab - 2b^2) \cdot z &= a^2b - ab^2 \quad | : (2ab - 2b^2) \\ z &= \frac{a^2b - ab^2}{2ab - 2b^2} \\ z &= \frac{a \cdot (ab - b^2)}{2 \cdot (ab - b^2)} \\ z &= \frac{a}{2} \end{aligned}$$

Die Lösungsmenge lautet: $L = \left\{ \left(\frac{2a}{a-b} \mid \frac{b}{a-b} \mid \frac{a}{2} \right) \right\}$