

Wurzelgleichungen

W. Kippels

4. September 2020

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	3
2	Grundlagen	4
3	Übungsaufgaben	6
3.1	Aufgabe 1	6
3.2	Aufgabe 2	6
3.3	Aufgabe 3	6
3.4	Aufgabe 4	6
3.5	Aufgabe 5	6
3.6	Aufgabe 6	6
3.7	Aufgabe 7	6
3.8	Aufgabe 8	6
3.9	Aufgabe 9	7
3.10	Aufgabe 10	7
3.11	Aufgabe 11	7
3.12	Aufgabe 12	7
3.13	Aufgabe 13	7
3.14	Aufgabe 14	7
3.15	Aufgabe 15	7
3.16	Aufgabe 16	7
3.17	Aufgabe 17	7
3.18	Aufgabe 18	7
3.19	Aufgabe 19	7
3.20	Aufgabe 20	8
4	Musterlösungen zu den Übungsaufgaben	9
4.1	Lösung Aufgabe 1	9
4.2	Lösung Aufgabe 2	10
4.3	Lösung Aufgabe 3	11

4.4	Lösung Aufgabe 4	12
4.5	Lösung Aufgabe 5	13
4.6	Lösung Aufgabe 6	14
4.7	Lösung Aufgabe 7	16
4.8	Lösung Aufgabe 8	17
4.9	Lösung Aufgabe 9	18
4.10	Lösung Aufgabe 10	19
4.11	Lösung Aufgabe 11	20
4.12	Lösung Aufgabe 12	21
4.13	Lösung Aufgabe 13	22
4.14	Lösung Aufgabe 14	23
4.15	Lösung Aufgabe 15	24
4.16	Lösung Aufgabe 16	25
4.17	Lösung Aufgabe 17	26
4.18	Aufgabe 18	27
4.19	Aufgabe 19	28
4.20	Aufgabe 20	29

1 Vorwort

Diese und ähnliche Anleitungen zu erstellen erfordert sehr viel Zeit und Mühe. Trotzdem stelle ich alles kostenfrei der Allgemeinheit zur Verfügung. Wenn Sie diese Datei hilfreich finden, dann bitte ich Sie um Erfüllung des nachfolgend beschriebenen „Generationenvertrages“:

Wenn Sie später einmal Ihre Ausbildungsphase beendet haben und im Beruf stehen (oder auch noch danach), geben Sie bitte Ihr Wissen in geeigneter Form an die nachfolgende Generation weiter.

Wenn Sie mir eine Freude machen wollen, dann schreiben Sie mir bitte eine kleine Email an die folgende Adresse: mail@dk4ek.de

Vielen Dank!

2 Grundlagen

Beim Lösen mathematischer Probleme stößt man gelegentlich auch auf Gleichungen, die eine oder auch mehrere Quadratwurzeln enthalten. Diese Gleichungen nennt man **Wurzelgleichungen**. Hier ein Beispiel:

$$5 + \sqrt{5x - 1} = x$$

Im folgenden möchte ich Strategien vorstellen, wie man solche Gleichungen lösen kann.

Die erste Idee, die mancher vielleicht hat, lautet: „Man müsste die Gleichung quadrieren, dann ist die Wurzel weg.“ Leider klappt das nur, wenn man auf diese Weise die Binomischen Formeln missachtet:

$$\begin{array}{rcl} 5 + \sqrt{5x - 1} & = & x \quad | \quad ()^2 \\ 25 + (5x - 1) & = & x^2 \end{array}$$

Leider ist das falsch. Es gibt nämlich keine Formel, die lauten würde: $(a + b)^2 = a^2 + b^2$. Richtig hingegen ist: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Beachtet man diese Formel, erhält man:

$$\begin{array}{rcl} 5 + \sqrt{5x - 1} & = & x \quad | \quad ()^2 \\ 25 + 10 \cdot \sqrt{5x - 1} + (5x - 1) & = & x^2 \end{array}$$

Das hilft also nicht weiter. Es ist immer noch eine Wurzel da. Abhilfe ist jedoch möglich, wenn man vor dem Quadrieren dafür sorgt, dass die Wurzel allein auf einer Seite steht:

$$\begin{array}{rcl} 5 + \sqrt{5x - 1} & = & x \quad | \quad - 5 \\ \sqrt{5x - 1} & = & x - 5 \quad | \quad ()^2 \\ 5x - 1 & = & x^2 - 10x + 25 \end{array}$$

Jetzt haben wir eine „normale“ Quadratische Gleichung¹ erhalten, die keine Wurzel mehr enthält. Diese kann nun gelöst werden:

$$\begin{array}{rcl} 5x - 1 & = & x^2 - 10x + 25 \quad | \quad - 5x + 1 \\ 0 & = & x^2 - 15x + 26 \\ x_{1/2} & = & \frac{15}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{15}{2}\right)^2 - 26} \\ & = & \frac{15}{2} \pm \sqrt{\frac{225}{4} - \frac{104}{4}} \\ & = & \frac{15}{2} \pm \frac{11}{2} \\ x_1 = \frac{4}{2} = 2 & & x_2 = \frac{26}{2} = 13 \end{array}$$

¹Eine Anleitung zum Lösen Quadratischer Gleichungen (einschließlich Übungsaufgaben mit Lösungen) ist hier zu finden: <http://www.dk4ek.de/lib/exe/fetch.php/quad.pdf>

Offenbar haben wir die Lösungsmenge $L = \{2; 13\}$.

Führen wir sicherheitshalber einmal eine Probe durch. Beginnen wir mit $x_1 = 2$.

$$\begin{aligned}5 + \sqrt{5x - 1} &= x \\5 + \sqrt{5 \cdot 2 - 1} &= 2 \\5 + \sqrt{9} &= 2 \\5 + 3 &\neq 2\end{aligned}$$

Nanu, was ist denn da passiert? Die Probe geht **nicht** auf! Haben wir etwa einen Rechenfehler gemacht? Führen wir vor weiteren Überlegungen erst noch die Probe mit $x_2 = 13$ durch.

$$\begin{aligned}5 + \sqrt{5x - 1} &= x \\5 + \sqrt{5 \cdot 13 - 1} &= 13 \\5 + \sqrt{64} &= 13 \\5 + 8 &= 13\end{aligned}$$

Erstaunlicherweise(?) geht diesmal die Probe auf, haben wir uns doch nicht verrechnet?

Sehen wir uns das Ergebnis der Probe mit $x_1 = 2$ einmal genau an. Wenn vor der Wurzel ein Minuszeichen gestanden hätte, dann würde die letzte Zeile lauten:

$$5 - 3 = 2$$

Das wäre richtig. Im Schritt 2, in dem wir die Gleichung (und damit auch die Wurzel) quadriert haben, wäre dieses Minuszeichen vor der Wurzel „wegquadriert“ worden. Zeile 3 hätten wir also sowohl mit einem Pluszeichen, als auch mit einem Minuszeichen vor der Wurzel erhalten. **Wir haben also durch das Quadrieren eine Gleichung erhalten, die *mehr Lösungen* als die Originalgleichung hat.** Dieser Schritt war nämlich keine sogenannte *Äquivalenzumformung*.

Was lernen wir daraus? Bei der Lösung von Wurzelgleichungen erhalten wir möglicherweise mehr Lösungen, als tatsächlich die Wurzelgleichung erfüllen. Daraus ergibt sich folgender Merksatz:

Man muss nach dem Lösen einer Wurzelgleichung **stets** eine Probe machen.

3 Übungsaufgaben

Hier sind einige Übungsaufgaben zu Wurzelgleichungen zusammengestellt. Bestimmen Sie die Lösungsmengen der Gleichungen! Denken Sie daran, dass vor Festlegung der Lösungsmenge die Proben erforderlich sind!

Die durchgerechneten Lösungen zu diesen Aufgaben finden Sie im nächsten Hauptkapitel.

3.1 Aufgabe 1

$$2 + \sqrt{3x - 2} = 5x - 6$$

3.2 Aufgabe 2

$$\sqrt{7x + 15} = \sqrt{2x - 5} + 5$$

3.3 Aufgabe 3

$$x + 2 + \sqrt{24x - 72} = 5 - x$$

3.4 Aufgabe 4

$$\sqrt{2x + 4} - \sqrt{5x + 1} = \sqrt{2x + 16} - \sqrt{5x + 9}$$

3.5 Aufgabe 5

$$\sqrt{5x + 1} + \sqrt{4x - 3} = \sqrt{2x - 5}$$

3.6 Aufgabe 6

$$4 \cdot \sqrt{3x + 4} - 4 \cdot \sqrt{4x + 1} = \frac{4 \cdot \sqrt{3x + 4} - 1}{\sqrt{3x + 4} + \sqrt{4x + 1}}$$

3.7 Aufgabe 7

$$x - \sqrt{33 - x^2 - 4x} = 5$$

3.8 Aufgabe 8

$$\sqrt{\sqrt{5x + 4} - \sqrt{2x - 1}} = 2$$

3.9 Aufgabe 9

$$\sqrt{2x-1} + \sqrt{6x+3} = \sqrt{11x+5}$$

3.10 Aufgabe 10

$$2x - 26 \cdot \sqrt{x} + 72 = 0$$

3.11 Aufgabe 11

$$2x - 3 \cdot \sqrt{x} = 2$$

3.12 Aufgabe 12

$$\sqrt{x+3} + \sqrt{2x+5} = 2$$

3.13 Aufgabe 13

$$\sqrt{x+4} = \sqrt{2x-1} + 6$$

3.14 Aufgabe 14

$$30x - 16 \cdot \sqrt{x} + 2 = 0$$

3.15 Aufgabe 15

$$\sqrt{5+x} - \sqrt{5-x} = \sqrt{3-x} - \sqrt{3+x}$$

3.16 Aufgabe 16

$$\sqrt{\sqrt{5x+1} + \sqrt{3x-5} - 1} = 3$$

3.17 Aufgabe 17

$$3x - \sqrt{2x+30} + 17 = 0$$

3.18 Aufgabe 18

$$\sqrt{7x-3} + \sqrt{6x+12} = 1$$

3.19 Aufgabe 19

$$\frac{2}{\sqrt{x+6}} + \sqrt{x+6} = \frac{\sqrt{11-5x}}{2 \cdot \sqrt{x+6}}$$

3.20 Aufgabe 20

$$\sqrt{5x+6} - \sqrt{2x+6} = \sqrt{10-6x} - \sqrt{5x+6}$$

4 Musterlösungen zu den Übungsaufgaben

Hier finden Sie die durchgerechneten Lösungen zu allen Aufgaben.

4.1 Lösung Aufgabe 1

$$\begin{aligned}2 + \sqrt{3x - 2} &= 5x - 6 && | - 2 \\ \sqrt{3x - 2} &= 5x - 8 && | ()^2 \\ 3x - 2 &= 25x^2 - 80x + 64 && | - 3x + 2 \\ 0 &= 25x^2 - 83x + 66 && | : 25 \\ 0 &= x^2 - \frac{83}{25}x + \frac{66}{25} && | \text{p-q-Formel} \\ x_{1/2} &= \frac{83}{50} \pm \sqrt{\frac{6889}{2500} - \frac{6600}{2500}} \\ x_{1/2} &= \frac{83}{50} \pm \frac{17}{50} \\ x_1 = \frac{66}{50} &= 1,32 & x_2 = \frac{100}{50} &= 2\end{aligned}$$

Probe mit $x_1 = 1,32$:

$$\begin{aligned}2 + \sqrt{3x - 2} &= 5x - 6 \\ 2 + \sqrt{3 \cdot 1,32 - 2} &= 5 \cdot 1,32 - 6 \\ 2 + \sqrt{1,96} &= 0,6 \\ 2 + 1,4 &\neq 0,6\end{aligned}$$

$x_1 = 1,32$ ist **keine** Lösung!

Probe mit $x_2 = 2$:

$$\begin{aligned}2 + \sqrt{3x - 2} &= 5x - 6 \\ 2 + \sqrt{3 \cdot 2 - 2} &= 5 \cdot 2 - 6 \\ 2 + \sqrt{4} &= 4 \\ 2 + 2 &= 4\end{aligned}$$

$x_2 = 2$ ist eine Lösung!

Aus dem Ergebnis der Proben ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \{2\}$

4.2 Lösung Aufgabe 2

$$\sqrt{7x+15} = \sqrt{2x-5} + 5$$

In dieser Aufgabe haben wir sogar **zwei** Wurzeln! Leider ist es nicht möglich, beide Wurzeln **gleichzeitig** in einem Schritt zu eliminieren. Da eine Wurzel allein auf einer Seite steht, kann jedoch quadriert werden, um die linke Wurzel loszuwerden.

$$\begin{aligned} \sqrt{7x+15} &= \sqrt{2x-5} + 5 && | ()^2 \\ 7x+15 &= (2x-5) + 10 \cdot \sqrt{2x-5} + 25 && \\ 7x+15 &= 2x+20 + 10 \cdot \sqrt{2x-5} && | -2x-20 \\ 5x-5 &= 10 \cdot \sqrt{2x-5} && | :5 \\ x-1 &= 2 \cdot \sqrt{2x-5} && | ()^2 \\ x^2-2x+1 &= 4 \cdot (2x-5) && \\ x^2-2x+1 &= 8x-20 && | -8x+20 \\ x^2-10x+21 &= 0 && | \text{p-q-Formel} \\ x_{1/2} &= 5 \pm \sqrt{25-21} && \\ x_{1/2} &= 5 \pm 2 && \\ x_1 = 3 & \quad x_2 = 7 && \end{aligned}$$

Probe mit $x_1 = 3$:

$$\begin{aligned} \sqrt{7x+15} &= \sqrt{2x-5} + 5 \\ \sqrt{7 \cdot 3 + 15} &= \sqrt{2 \cdot 3 - 5} + 5 \\ \sqrt{36} &= \sqrt{1} + 5 \\ 6 &= 1 + 5 \end{aligned}$$

$x_1 = 3$ ist eine Lösung.

Probe mit $x_2 = 7$:

$$\begin{aligned} \sqrt{7x+15} &= \sqrt{2x-5} + 5 \\ \sqrt{7 \cdot 7 + 15} &= \sqrt{2 \cdot 7 - 5} + 5 \\ \sqrt{64} &= \sqrt{9} + 5 \\ 8 &= 3 + 5 \end{aligned}$$

$x_2 = 7$ ist (auch) eine Lösung.

Aus dem Ergebnis der Proben ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \{3; 7\}$

4.3 Lösung Aufgabe 3

$$\begin{aligned}x + 2 + \sqrt{24x - 72} &= 5 - x && | -x - 2 \\ \sqrt{24x - 72} &= 3 - 2x && | ()^2 \\ 24x - 72 &= 9 - 12x + 4x^2 && | -24x + 72 \\ 0 &= 4x^2 - 36x + 81 && | : 4 \\ 0 &= x^2 - 9x + \frac{81}{4} && | \text{p-q-Formel} \\ x_{1/2} &= \frac{9}{2} \pm \sqrt{\frac{81}{4} - \frac{81}{4}} \\ x_{1/2} &= \frac{9}{2} \pm 0 \\ x &= 4,5\end{aligned}$$

Probe mit $x = 4,5$:

$$\begin{aligned}x + 2 + \sqrt{24x - 72} &= 5 - x \\ 4,5 + 2 + \sqrt{24 \cdot 4,5 - 72} &= 5 - 4,5 \\ 6,5 + \sqrt{36} &= 0,5 \\ 6,5 + 6 &\neq 0,5\end{aligned}$$

Es gibt **keine** Lösung für die Gleichung, die Lösungsmenge lautet: $L = \{ \}$

4.4 Lösung Aufgabe 4

$$\sqrt{2x+4} - \sqrt{5x+1} = \sqrt{2x+16} - \sqrt{5x+9}$$

Hier haben wir gleich 4 Wurzeln! Durch Quadrieren kann man aber deren Zahl auf 2 reduzieren.

$$\begin{aligned} \sqrt{2x+4} - \sqrt{5x+1} &= \sqrt{2x+16} - \sqrt{5x+9} \quad | ()^2 \\ 2x+4 - 2 \cdot \sqrt{2x+4} \cdot \sqrt{5x+1} + 5x+1 &= 2x+16 - 2 \cdot \sqrt{2x+16} \cdot \sqrt{5x+9} + 5x+9 \\ 7x+5 - 2 \cdot \sqrt{(2x+4) \cdot (5x+1)} &= 7x+25 - 2 \cdot \sqrt{(2x+16) \cdot (5x+9)} \\ 7x+5 - 2 \cdot \sqrt{10x^2+2x+20x+4} &= 7x+25 - 2 \cdot \sqrt{10x^2+18x+80x+144} \quad | -7x-5 \\ -2 \cdot \sqrt{10x^2+22x+4} &= 20 - 2 \cdot \sqrt{10x^2+98x+144} \quad | ()^2 \\ 4 \cdot (10x^2+22x+4) &= 400 - 80 \cdot \sqrt{10x^2+98x+144} + 4 \cdot (10x^2+98x+144) \\ 40x^2+88x+16 &= 400 - 80 \cdot \sqrt{10x^2+98x+144} + 40x^2+392x+576 \quad | -40x^2 \\ 88x+16 &= -80 \cdot \sqrt{10x^2+98x+144} + 392x+976 \quad | -392x-976 \\ -304x-960 &= -80 \cdot \sqrt{10x^2+98x+144} \quad | :(-16) \\ 19x+60 &= 5 \cdot \sqrt{10x^2+98x+144} \quad | ()^2 \\ 361x^2+2280x+3600 &= 25 \cdot (10x^2+98x+144) \\ 361x^2+2280x+3600 &= 250x^2+2450x+3600 \quad | -250x^2-2450x-3600 \\ 111x^2-170x &= 0 \quad | :111 \\ x^2 - \frac{170}{111}x &= 0 \\ x \cdot \left(x - \frac{170}{111} \right) &= 0 \\ x_1 = 0 \quad x_2 &= \frac{170}{111} \end{aligned}$$

Probe mit $x_1 = 0$:

$$\begin{aligned} \sqrt{2 \cdot 0 + 4} - \sqrt{5 \cdot 0 + 1} &= \sqrt{2 \cdot 0 + 16} - \sqrt{5 \cdot 0 + 9} \\ \sqrt{4} - \sqrt{1} &= \sqrt{16} - \sqrt{9} \\ 2 - 1 &= 4 - 3 \end{aligned}$$

Probe mit $x_2 = \frac{170}{111}$:

$$\begin{aligned} \sqrt{2 \cdot \frac{170}{111} + 4} - \sqrt{5 \cdot \frac{170}{111} + 1} &= \sqrt{2 \cdot \frac{170}{111} + 16} - \sqrt{5 \cdot \frac{170}{111} + 9} \\ \sqrt{\frac{784}{111}} - \sqrt{\frac{961}{111}} &= \sqrt{\frac{2116}{111}} - \sqrt{\frac{1849}{111}} \\ \frac{\sqrt{784}}{\sqrt{111}} - \frac{\sqrt{961}}{\sqrt{111}} &= \frac{\sqrt{2116}}{\sqrt{111}} - \frac{\sqrt{1849}}{\sqrt{111}} \\ \frac{28}{\sqrt{111}} - \frac{31}{\sqrt{111}} &= \frac{46}{\sqrt{111}} - \frac{43}{\sqrt{111}} \\ -\frac{3}{\sqrt{111}} &\neq \frac{3}{\sqrt{111}} \end{aligned}$$

Aus dem Ergebnis der Proben ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \{0\}$

4.5 Lösung Aufgabe 5

$$\sqrt{5x+1} + \sqrt{4x-3} = \sqrt{2x-5}$$

Hier kann sofort quadriert werden.

$$\begin{aligned} \sqrt{5x+1} + \sqrt{4x-3} &= \sqrt{2x-5} && |(\)^2 \\ 5x+1 + 2 \cdot \sqrt{(5x+1) \cdot (4x-3)} + 4x-3 &= 2x-5 && | -9x+2 \\ 2 \cdot \sqrt{20x^2 - 15x + 4x - 3} &= -7x-3 && |(\)^2 \\ 4 \cdot (20x^2 - 11x - 3) &= 49x^2 + 42x + 9 \\ 80x^2 - 44x - 12 &= 49x^2 + 42x + 9 && | -49x^2 - 42x - 9 \\ 31x^2 - 86x - 21 &= 0 && | : 31 \\ x^2 - \frac{86}{31}x - \frac{21}{31} &= 0 \\ x_{1/2} &= \frac{43}{31} \pm \sqrt{\frac{1849}{961} + \frac{651}{961}} \\ x_{1/2} &= \frac{43}{31} \pm \sqrt{\frac{2500}{961}} \\ x_{1/2} &= \frac{43}{31} \pm \frac{50}{31} \\ x_1 &= -\frac{7}{31} && x_2 = 3 \end{aligned}$$

Probe mit $x_1 = -\frac{7}{31}$:

$$\begin{aligned} \sqrt{5x+1} + \sqrt{4x-3} &= \sqrt{2x-5} \\ \sqrt{5 \cdot \left(-\frac{7}{31}\right) + 1} + \sqrt{4 \cdot \left(-\frac{7}{31}\right) - 3} &= \sqrt{2 \cdot \left(-\frac{7}{31}\right) - 5} \\ \sqrt{-\frac{4}{31}} + \sqrt{-\frac{121}{31}} &= \sqrt{-\frac{169}{31}} \end{aligned}$$

Da die Wurzeln alle keine (reelle) Lösung haben, ist $x_1 = -\frac{7}{31}$ keine Lösung.

Probe mit $x_2 = 3$:

$$\begin{aligned} \sqrt{5x+1} + \sqrt{4x-3} &= \sqrt{2x-5} \\ \sqrt{5 \cdot 3 + 1} + \sqrt{4 \cdot 3 - 3} &= \sqrt{2 \cdot 3 - 5} \\ \sqrt{16} + \sqrt{9} &= \sqrt{1} \\ 4 + 3 &\neq 1 \end{aligned}$$

Auch $x_2 = 3$ erfüllt nicht die Gleichung.

Aus dem Ergebnis der Proben ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \{ \}$

4.6 Lösung Aufgabe 6

$$4 \cdot \sqrt{3x+4} - 4 \cdot \sqrt{4x+1} = \frac{4 \cdot \sqrt{3x+4} - 1}{\sqrt{3x+4} + \sqrt{4x+1}}$$

Es soll auffallen, dass der Nenner des Bruches annähernd identisch mit der linken Gleichungsseite ist. Nur das Rechenzeichen dazwischen ist anders. Multipliziert man nun die Gleichung mit dem (rechten) Nenner, dann löst die dritte Binomische Formel links alle Wurzeln auf.

$$\begin{aligned}
 4 \cdot \sqrt{3x+4} - 4 \cdot \sqrt{4x+1} &= \frac{4 \cdot \sqrt{3x+4} - 1}{\sqrt{3x+4} + \sqrt{4x+1}} \\
 4 \cdot (\sqrt{3x+4} - \sqrt{4x+1}) &= \frac{4 \cdot \sqrt{3x+4} - 1}{\sqrt{3x+4} + \sqrt{4x+1}} \quad | \cdot (\sqrt{3x+4} + \sqrt{4x+1}) \\
 4 \cdot ((3x+4) - (4x+1)) &= 4 \cdot \sqrt{3x+4} - 1 \\
 4 \cdot (3x+4 - 4x - 1) &= 4 \cdot \sqrt{3x+4} - 1 \\
 4 \cdot (-x+3) &= 4 \cdot \sqrt{3x+4} - 1 \\
 -4x+12 &= 4 \cdot \sqrt{3x+4} - 1 \quad | +1 \\
 -4x+13 &= 4 \cdot \sqrt{3x+4} \quad | ()^2 \\
 16x^2 - 104x + 169 &= 16 \cdot (3x+4) \\
 16x^2 - 104x + 169 &= 48x + 64 \quad | -48x - 64 \\
 16x^2 - 152x + 105 &= 0 \quad | :16 \\
 x^2 - \frac{19}{2}x + \frac{105}{16} &= 0 \\
 x_{1/2} &= \frac{19}{4} \pm \sqrt{\frac{361}{16} - \frac{105}{16}} \\
 x_{1/2} &= \frac{19}{4} \pm \sqrt{\frac{256}{16}} \\
 x_{1/2} &= \frac{19}{4} \pm \frac{16}{4} \\
 x_1 &= \frac{3}{4} \quad x_2 = \frac{35}{4}
 \end{aligned}$$

Probe mit $x_1 = \frac{3}{4}$:

$$\begin{aligned}4 \cdot \sqrt{3x+4} - 4 \cdot \sqrt{4x+1} &= \frac{4 \cdot \sqrt{3x+4} - 1}{\sqrt{3x+4} + \sqrt{4x+1}} \\4 \cdot \sqrt{3 \cdot \frac{3}{4} + 4} - 4 \cdot \sqrt{4 \cdot \frac{3}{4} + 1} &= \frac{4 \cdot \sqrt{3 \cdot \frac{3}{4} + 4} - 1}{\sqrt{3 \cdot \frac{3}{4} + 4} + \sqrt{4 \cdot \frac{3}{4} + 1}} \\4 \cdot \sqrt{\frac{25}{4}} - 4 \cdot \sqrt{4} &= \frac{4 \cdot \sqrt{\frac{25}{4}} - 1}{\sqrt{\frac{25}{4}} + \sqrt{4}} \\4 \cdot \frac{5}{2} - 4 \cdot 2 &= \frac{4 \cdot \frac{5}{2} - 1}{\frac{5}{2} + 2} \\10 - 8 &= \frac{9}{\frac{5}{2}} \\2 &= \frac{9}{2}\end{aligned}$$

Probe mit $x_2 = \frac{35}{4}$:

$$\begin{aligned}4 \cdot \sqrt{3x+4} - 4 \cdot \sqrt{4x+1} &= \frac{4 \cdot \sqrt{3x+4} - 1}{\sqrt{3x+4} + \sqrt{4x+1}} \\4 \cdot \sqrt{3 \cdot \frac{35}{4} + 4} - 4 \cdot \sqrt{4 \cdot \frac{35}{4} + 1} &= \frac{4 \cdot \sqrt{3 \cdot \frac{35}{4} + 4} - 1}{\sqrt{3 \cdot \frac{35}{4} + 4} + \sqrt{4 \cdot \frac{35}{4} + 1}} \\4 \cdot \sqrt{\frac{121}{4}} - 4 \cdot \sqrt{36} &= \frac{4 \cdot \sqrt{\frac{121}{4}} - 1}{\sqrt{\frac{121}{4}} + \sqrt{36}} \\4 \cdot \frac{11}{2} - 4 \cdot 6 &= \frac{4 \cdot \frac{11}{2} - 1}{\frac{11}{2} + 6} \\22 - 24 &= \frac{21}{\frac{23}{2}} \\-2 &\neq \frac{42}{23}\end{aligned}$$

Aus dem Ergebnis der Proben ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \left\{ \frac{3}{4} \right\}$

4.7 Lösung Aufgabe 7

$$\begin{array}{rcll} x - \sqrt{33 - x^2 - 4x} & = & 5 & | -x \\ -\sqrt{33 - x^2 - 4x} & = & 5 - x & | ()^2 \\ 33 - x^2 - 4x & = & 25 - 10x + x^2 & | -33 + x^2 + 4x \\ 0 & = & 2x^2 - 6x - 8 & | :2 \\ 0 & = & x^2 - 3x - 4 & \\ x_{1/2} & = & \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{16}{4}} & \\ x_{1/2} & = & \frac{3}{2} \pm \frac{5}{2} & \\ x_1 = -1 & & x_2 = 4 & \end{array}$$

Probe mit $x_1 = -1$:

$$\begin{array}{rcl} x - \sqrt{33 - x^2 - 4x} & = & 5 \\ -1 - \sqrt{33 - (-1)^2 - 4 \cdot (-1)} & = & 5 \\ -1 - 6 & \neq & 5 \end{array}$$

Probe mit $x_2 = 4$:

$$\begin{array}{rcl} x - \sqrt{33 - x^2 - 4x} & = & 5 \\ 4 - \sqrt{33 - 4^2 - 4 \cdot 4} & = & 5 \\ 4 - 1 & \neq & 5 \end{array}$$

Aus dem Ergebnis der Proben ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \{ \}$

4.8 Lösung Aufgabe 8

$$\begin{aligned}
 \sqrt{\sqrt{5x+4} - \sqrt{2x-1}} &= 2 && | (\)^2 \\
 \sqrt{5x+4} - \sqrt{2x-1} &= 4 && | (\)^2 \\
 5x+4 - 2 \cdot \sqrt{(5x+4) \cdot (2x-1)} + 2x-1 &= 16 \\
 7x+3 - 2 \cdot \sqrt{10x^2 - 5x + 8x - 4} &= 16 && | -7x - 3 \\
 -2 \cdot \sqrt{10x^2 + 3x - 4} &= -7x + 13 && | (\)^2 \\
 4 \cdot (10x^2 + 3x - 4) &= 49x^2 - 182x + 169 \\
 40x^2 + 12x - 16 &= 49x^2 - 182x + 169 && | -40x^2 - 12x + 16 \\
 0 &= 9x^2 - 194x + 185 && | : 9 \\
 0 &= x^2 - \frac{194}{9}x + \frac{185}{9} \\
 x_{1/2} &= \frac{97}{9} \pm \sqrt{\frac{9409}{81} - \frac{1665}{81}} \\
 x_{1/2} &= \frac{97}{9} \pm \frac{88}{9} \\
 x_1 = \frac{185}{9} & \quad x_2 = 1
 \end{aligned}$$

Probe mit $x_1 = \frac{185}{9}$:

$$\begin{aligned}
 \sqrt{\sqrt{5x+4} - \sqrt{2x-1}} &= 2 \\
 \sqrt{\sqrt{5 \cdot \frac{185}{9} + 4} - \sqrt{2 \cdot \frac{185}{9} - 1}} &= 2 \\
 \sqrt{\sqrt{\frac{961}{9}} - \sqrt{\frac{361}{9}}} &= 2 \\
 \sqrt{\frac{31}{3} - \frac{19}{3}} &= 2 \\
 \sqrt{\frac{12}{3}} &= 2 \\
 \sqrt{4} &= 2
 \end{aligned}$$

Probe mit $x_2 = 1$:

$$\begin{aligned}
 \sqrt{\sqrt{5x+4} - \sqrt{2x-1}} &= 2 \\
 \sqrt{\sqrt{5 \cdot 1 + 4} - \sqrt{2 \cdot 1 - 1}} &= 2 \\
 \sqrt{\sqrt{9} - \sqrt{1}} &= 2 \\
 \sqrt{3-1} &= 2 \\
 \sqrt{2} &\neq 2
 \end{aligned}$$

Aus dem Ergebnis der Proben ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \left\{ \frac{185}{9} \right\}$

4.9 Lösung Aufgabe 9

$$\begin{aligned}
 \sqrt{2x-1} + \sqrt{6x+3} &= \sqrt{11x+5} && | ()^2 \\
 2x-1 + 2 \cdot \sqrt{(2x-1) \cdot (6x+3)} + 6x+3 &= 11x+5 \\
 8x+2 + 2 \cdot \sqrt{12x^2+6x-6x-3} &= 11x+5 && | -8x-2 \\
 2 \cdot \sqrt{12x^2-3} &= 3x+3 && | ()^2 \\
 4 \cdot (12x^2-3) &= 9x^2+18x+9 \\
 48x^2-12 &= 9x^2+18x+9 && | -9x^2-18x-9 \\
 39x^2-18x-21 &= 0 && | :39 \\
 x^2 - \frac{6}{13}x - \frac{7}{13} &= 0 \\
 x_{1/2} &= \frac{3}{13} \pm \sqrt{\frac{9}{169} + \frac{91}{169}} \\
 x_{1/2} &= \frac{3}{13} \pm \frac{10}{13} \\
 x_1 &= -\frac{7}{13} && x_2 = 1
 \end{aligned}$$

Probe mit $x_1 = -\frac{7}{13}$:

$$\begin{aligned}
 \sqrt{2x-1} + \sqrt{6x+3} &= \sqrt{11x+5} \\
 \sqrt{2 \cdot \left(-\frac{7}{13}\right) - 1} + \sqrt{6 \cdot \left(-\frac{7}{13}\right) + 3} &= \sqrt{11 \cdot \left(-\frac{7}{13}\right) + 5} \\
 \sqrt{-\frac{27}{13}} + \sqrt{-\frac{3}{13}} &= \sqrt{-\frac{12}{13}}
 \end{aligned}$$

Keine der Wurzeln hat eine (reelle) Lösung. Daher gehört x_1 **nicht** zur Lösungsmenge.

Probe mit $x_2 = 1$:

$$\begin{aligned}
 \sqrt{2x-1} + \sqrt{6x+3} &= \sqrt{11x+5} \\
 \sqrt{2 \cdot 1 - 1} + \sqrt{6 \cdot 1 + 3} &= \sqrt{11 \cdot 1 + 5} \\
 \sqrt{1} + \sqrt{9} &= \sqrt{16} \\
 1 + 3 &= 4
 \end{aligned}$$

Aus dem Ergebnis der Proben ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \{1\}$

4.10 Lösung Aufgabe 10

$$\begin{aligned}2x - 26 \cdot \sqrt{x} + 72 &= 0 && | + 26 \cdot \sqrt{x} \\2x + 72 &= 26 \cdot \sqrt{x} && | ()^2 \\4x^2 + 288x + 5184 &= 676x && | - 676x \\4x^2 - 388x + 5184 &= 0 && | : 4 \\x^2 - 97x + 1296 &= 0 \\x_{1/2} &= \frac{97}{2} \pm \sqrt{\frac{9409}{4} - 1296} \\x_{1/2} &= \frac{97}{2} \pm \sqrt{\frac{9409}{4} - \frac{5184}{4}} \\x_{1/2} &= \frac{97}{2} \pm \sqrt{\frac{4255}{4}} \\x_{1/2} &= \frac{97}{2} \pm \frac{65}{2} \\x_1 = 16 & \quad x_2 = 81\end{aligned}$$

Probe mit $x_1 = 16$:

$$\begin{aligned}2x - 26 \cdot \sqrt{x} + 72 &= 0 \\2 \cdot 16 - 26 \cdot \sqrt{16} + 72 &= 0 \\32 - 26 \cdot 4 + 72 &= 0 \\32 - 104 + 72 &= 0 \\0 &= 0\end{aligned}$$

Probe mit $x_2 = 81$:

$$\begin{aligned}2x - 26 \cdot \sqrt{x} + 72 &= 0 \\2 \cdot 81 - 26 \cdot \sqrt{81} + 72 &= 0 \\162 - 26 \cdot 9 + 72 &= 0 \\162 - 234 + 72 &= 0 \\0 &= 0\end{aligned}$$

Aus dem Ergebnis der Proben ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \{16; 81\}$

4.11 Lösung Aufgabe 11

$$\begin{array}{rcll} 2x - 3 \cdot \sqrt{x} & = & 2 & | + 3 \cdot \sqrt{x} - 2 \\ 2x - 2 & = & 3 \cdot \sqrt{x} & | ()^2 \\ 4x^2 - 8x + 4 & = & 9 \cdot x & | - 9x \\ 4x^2 - 17x + 4 & = & 0 & | : 4 \\ x^2 - \frac{17}{4}x + 1 & = & 0 & \\ x_{1/2} & = & \frac{17}{8} \pm \sqrt{\frac{289}{64} - 1} & \\ x_{1/2} & = & \frac{17}{8} \pm \sqrt{\frac{289}{64} - \frac{64}{64}} & \\ x_{1/2} & = & \frac{17}{8} \pm \sqrt{\frac{225}{64}} & \\ x_{1/2} & = & \frac{17}{8} \pm \frac{15}{8} & \\ x_1 = \frac{1}{4} & & x_2 = 4 & \end{array}$$

Probe mit $x_1 = \frac{1}{4}$:

$$\begin{array}{rcl} 2x - 3 \cdot \sqrt{x} & = & 2 \\ 2 \cdot \frac{1}{4} - 3 \cdot \sqrt{\frac{1}{4}} & = & 2 \\ \frac{1}{2} - \frac{3}{2} & \neq & 2 \end{array}$$

Probe mit $x_2 = 4$:

$$\begin{array}{rcl} 2x - 3 \cdot \sqrt{x} & = & 2 \\ 2 \cdot 4 - 3 \cdot \sqrt{4} & = & 2 \\ 8 - 6 & = & 2 \end{array}$$

Aus dem Ergebnis der Proben ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \{4\}$

4.12 Lösung Aufgabe 12

$$\begin{aligned}\sqrt{x+3} + \sqrt{2x+5} &= 2 && | ()^2 \\ x+3 + 2 \cdot \sqrt{(x+3) \cdot (2x+5)} + 2x+5 &= 4 \\ 3x+8 + 2 \cdot \sqrt{2x^2+5x+6x+15} &= 4 \\ 3x+8 + 2 \cdot \sqrt{2x^2+11x+15} &= 4 && | -3x-8 \\ 2 \cdot \sqrt{2x^2+11x+15} &= -3x-4 && | ()^2 \\ 4 \cdot (2x^2+11x+15) &= 9x^2+24x+16 \\ 8x^2+44x+60 &= 9x^2+24x+16 && | -8x^2-44x-60 \\ 0 &= x^2-20x-44 \\ x_{1/2} &= 10 \pm \sqrt{100+44} \\ x_{1/2} &= 10 \pm 12 \\ x_1 = -2 & & x_2 = 22\end{aligned}$$

Probe mit $x_1 = -2$:

$$\begin{aligned}\sqrt{x+3} + \sqrt{2x+5} &= 2 \\ \sqrt{-2+3} + \sqrt{2 \cdot (-2)+5} &= 2 \\ 1+1 &= 2\end{aligned}$$

Probe mit $x_2 = 22$:

$$\begin{aligned}\sqrt{x+3} + \sqrt{2x+5} &= 2 \\ \sqrt{22+3} + \sqrt{2 \cdot 22+5} &= 2 \\ 5+7 &\neq 2\end{aligned}$$

Aus dem Ergebnis der Proben ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \{-2\}$

4.13 Lösung Aufgabe 13

$$\begin{aligned}\sqrt{x+4} &= \sqrt{2x-1} + 6 & | (\)^2 \\ x+4 &= 2x-1 + 12 \cdot \sqrt{2x-1} + 36 & | -2x-35 \\ -x-31 &= 12 \cdot \sqrt{2x-1} & | (\)^2 \\ x^2 + 62x + 961 &= 144 \cdot (2x-1) \\ x^2 + 62x + 961 &= 288x - 144 & | -288x + 144 \\ x^2 + 226x + 1105 &= 0 \\ x_{1/2} &= -113 \pm \sqrt{12769 - 1105} \\ x_{1/2} &= 113 \pm 108 \\ x_1 = 5 & \quad x_2 = 221\end{aligned}$$

Probe mit $x_1 = 5$:

$$\begin{aligned}\sqrt{x+4} &= \sqrt{2x-1} + 6 \\ \sqrt{5+4} &= \sqrt{2 \cdot 5 - 1} + 6 \\ 3 &\neq 3 + 6\end{aligned}$$

Probe mit $x_2 = 221$:

$$\begin{aligned}\sqrt{x+4} &= \sqrt{2x-1} + 6 \\ \sqrt{221+4} &= \sqrt{2 \cdot 221 - 1} + 6 \\ 15 &\neq 21 + 6\end{aligned}$$

Aus dem Ergebnis der Proben ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \{ \}$

4.14 Lösung Aufgabe 14

$$\begin{array}{rcl}
 30x - 16 \cdot \sqrt{x} + 2 & = & 0 \\
 30x + 2 & = & 16 \cdot \sqrt{x} \\
 900x^2 + 120x + 4 & = & 256x \\
 900x^2 - 136x + 4 & = & 0 \\
 x^2 - \frac{34}{225}x + \frac{1}{225} & = & 0 \\
 x_{1/2} & = & \frac{17}{225} \pm \sqrt{\frac{289}{50625} - \frac{1}{225}} \\
 x_{1/2} & = & \frac{17}{225} \pm \sqrt{\frac{289}{50625} - \frac{225}{50625}} \\
 x_{1/2} & = & \frac{17}{225} \pm \frac{8}{225} \\
 x_1 = \frac{1}{25} & & x_2 = \frac{1}{9}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 | + 16 \cdot \sqrt{x} \\
 | ()^2 \\
 | - 256x \\
 | : 900
 \end{array}$$

Probe mit $x_1 = \frac{1}{25}$:

$$\begin{array}{rcl}
 30x - 16 \cdot \sqrt{x} + 2 & = & 0 \\
 30 \cdot \frac{1}{25} - 16 \cdot \sqrt{\frac{1}{25}} + 2 & = & 0 \\
 \frac{30}{25} - \frac{16}{5} + 2 & = & 0 \\
 \frac{6}{5} - \frac{16}{5} + \frac{10}{5} & = & 0
 \end{array}$$

Probe mit $x_2 = \frac{1}{9}$:

$$\begin{array}{rcl}
 30x - 16 \cdot \sqrt{x} + 2 & = & 0 \\
 30 \cdot \frac{1}{9} - 16 \cdot \sqrt{\frac{1}{9}} + 2 & = & 0 \\
 \frac{30}{9} - \frac{16}{3} + 2 & = & 0 \\
 \frac{10}{3} - \frac{16}{3} + \frac{6}{3} & = & 0
 \end{array}$$

Aus dem Ergebnis der Proben ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \left\{ \frac{1}{25}; \frac{1}{9} \right\}$

4.15 Lösung Aufgabe 15

$$\begin{array}{rcl}
 \sqrt{5+x} - \sqrt{5-x} & = & \sqrt{3-x} - \sqrt{3+x} & | \ (\)^2 \\
 5+x - 2 \cdot \sqrt{(5+x)(5-x)} + 5-x & = & 3-x - 2 \cdot \sqrt{(3-x)(3+x)} + 3+x & \\
 10 - 2 \cdot \sqrt{25-x^2} & = & 6 - 2 \cdot \sqrt{9-x^2} & | - 6 \\
 4 - 2 \cdot \sqrt{25-x^2} & = & -2 \cdot \sqrt{9-x^2} & | : 2 \\
 2 - \sqrt{25-x^2} & = & -\sqrt{9-x^2} & | \ (\)^2 \\
 4 - 4 \cdot \sqrt{25-x^2} + 25 - x^2 & = & 9 - x^2 & | + x^2 \\
 -4 \cdot \sqrt{25-x^2} + 29 & = & 9 & | - 29 \\
 -4 \cdot \sqrt{25-x^2} & = & -20 & | \ (\)^2 \\
 16 \cdot (25-x^2) & = & 400 & \\
 400 - 64x^2 & = & 400 & | - 400 \\
 -64x^2 & = & 0 & | : (-64) \\
 x^2 & = & 0 & | \sqrt{} \\
 x & = & 0 &
 \end{array}$$

Probe mit $x = 0$:

$$\begin{array}{rcl}
 \sqrt{5+x} - \sqrt{5-x} & = & \sqrt{3-x} - \sqrt{3+x} \\
 \sqrt{5+0} - \sqrt{5-0} & = & \sqrt{3-0} - \sqrt{3+0} \\
 \sqrt{5} - \sqrt{5} & = & \sqrt{3} - \sqrt{3} \\
 0 & = & 0
 \end{array}$$

Aus dem Ergebnis der Probe ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \{0\}$

4.16 Lösung Aufgabe 16

$$\begin{array}{rcl}
 \sqrt{\sqrt{5x+1} + \sqrt{3x-5} - 1} & = & 3 & | \text{ } (\)^2 \\
 \sqrt{5x+1} + \sqrt{3x-5} - 1 & = & 9 & | + 1 \\
 \sqrt{5x+1} + \sqrt{3x-5} & = & 10 & | \text{ } (\)^2 \\
 5x+1 + 2 \cdot \sqrt{(5x+1) \cdot (3x-5)} + 3x-5 & = & 100 \\
 8x-4 + 2 \cdot \sqrt{15x^2 - 25x + 3x - 5} & = & 100 & | - 8x + 4 \\
 2 \cdot \sqrt{15x^2 - 22x - 5} & = & -8x + 104 & | : 2 \\
 \sqrt{15x^2 - 22x - 5} & = & -4x + 52 & | \text{ } (\)^2 \\
 15x^2 - 22x - 5 & = & 16x^2 - 416x + 2704 & | - 15x^2 + 22x + 5 \\
 0 & = & x^2 - 394x + 2709 \\
 x_{1/2} & = & 197 \pm \sqrt{38809 - 2709} \\
 x_{1/2} & = & 197 \pm \sqrt{36100} \\
 x_{1/2} & = & 197 \pm 190 \\
 x_1 = 7 & & x_2 = 387
 \end{array}$$

Probe mit $x_1 = 7$:

$$\begin{array}{rcl}
 \sqrt{\sqrt{5x+1} + \sqrt{3x-5} - 1} & = & 3 \\
 \sqrt{\sqrt{5 \cdot 7 + 1} + \sqrt{3 \cdot 7 - 5} - 1} & = & 3 \\
 \sqrt{\sqrt{36} + \sqrt{16} - 1} & = & 3 \\
 \sqrt{6 + 4 - 1} & = & 3 \\
 \sqrt{9} & = & 3
 \end{array}$$

Probe mit $x_2 = 387$:

$$\begin{array}{rcl}
 \sqrt{\sqrt{5x+1} + \sqrt{3x-5} - 1} & = & 3 \\
 \sqrt{\sqrt{5 \cdot 387 + 1} + \sqrt{3 \cdot 387 - 5} - 1} & = & 3 \\
 \sqrt{\sqrt{1936} + \sqrt{1156} - 1} & = & 3 \\
 \sqrt{44 + 34 - 1} & = & 3 \\
 \sqrt{77} & \neq & 3
 \end{array}$$

Aus dem Ergebnis der Proben ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \{7\}$

4.17 Lösung Aufgabe 17

$$\begin{array}{rcl}
 3x - \sqrt{2x + 30} + 17 & = & 0 & | + \sqrt{2x + 30} \\
 3x + 17 & = & \sqrt{2x + 30} & | ()^2 \\
 9x^2 + 102x + 289 & = & 2x + 30 & | - 2x - 30 \\
 9x^2 + 100x + 259 & = & 0 & | : 9 \\
 x^2 + \frac{100}{9}x + \frac{259}{9} & = & 0 & | p-q-Formel \\
 x_{1/2} & = & -\frac{50}{9} \pm \sqrt{\frac{2500}{81} - \frac{2331}{81}} & \\
 & = & -\frac{50}{9} \pm \frac{13}{9} & \\
 x_1 = -\frac{50}{9} + \frac{13}{9} = -\frac{37}{9} & & x_2 = -\frac{50}{9} - \frac{13}{9} = -7 &
 \end{array}$$

Probe mit $x_1 = -\frac{37}{9}$:

$$\begin{aligned}
 3 \cdot \left(-\frac{37}{9}\right) - \sqrt{2 \cdot \left(-\frac{37}{9}\right) + 30} + 17 &= 0 \\
 -\frac{111}{9} - \sqrt{-\frac{74}{9} + \frac{270}{9}} + 17 &= 0 \\
 -\frac{37}{3} - \frac{16}{3} + 17 &= 0 \\
 -\frac{51}{3} + 17 &= 0 \\
 -17 + 17 &= 0
 \end{aligned}$$

Probe mit $x_2 = -7$:

$$\begin{aligned}
 3 \cdot (-7) - \sqrt{2 \cdot (-7) + 30} + 17 &= 0 \\
 -21 - 4 + 17 &= 0 \\
 -8 &\neq 0
 \end{aligned}$$

Aus dem Ergebnis der Proben ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \left\{-\frac{37}{9}\right\}$

4.18 Aufgabe 18

$$\begin{aligned}\sqrt{7x-3} + \sqrt{6x+12} &= 1 && | -\sqrt{6x+12} \\ \sqrt{7x-3} &= 1 - \sqrt{6x+12} && | ()^2 \\ 7x-3 &= 1^2 - 2 \cdot \sqrt{6x+12} + (6x+12) \\ 7x-3 &= 1 - 2 \cdot \sqrt{6x+12} + 6x+12 && | -6x-13 \\ x-16 &= -2 \cdot \sqrt{6x+12} && | ()^2 \\ x^2 - 32x + 256 &= 4 \cdot (6x+12) \\ x^2 - 32x + 256 &= 24x + 48 && | -24x - 48 \\ x^2 - 56x + 208 &= 0 && | p-q\text{-Formel} \\ x_{1/2} &= 28 \pm \sqrt{784 - 208} \\ &= 28 \pm 24 \\ x_1 = 28 + 24 = 52 && x_2 = 28 - 24 = 4\end{aligned}$$

Probe mit $x_1 = 52$:

$$\begin{aligned}\sqrt{7 \cdot 52 - 3} + \sqrt{6 \cdot 52 + 12} &= 1 \\ \sqrt{361} + \sqrt{324} &= 1 \\ 19 + 18 &\neq 0\end{aligned}$$

Probe mit $x_2 = 4$:

$$\begin{aligned}\sqrt{7 \cdot 4 - 3} + \sqrt{6 \cdot 4 + 12} &= 1 \\ \sqrt{25} + \sqrt{36} &= 1 \\ 5 + 6 &\neq 1\end{aligned}$$

Aus dem Ergebnis der Proben ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \{ \}$

4.19 Aufgabe 19

$$\begin{aligned}
 \frac{2}{\sqrt{x+6}} + \sqrt{x+6} &= \frac{\sqrt{11-5x}}{2 \cdot \sqrt{x+6}} && | \cdot 2 \cdot \sqrt{x+6} \\
 4 + 2 \cdot (x+6) &= \sqrt{11-5x} \\
 4 + 2x + 12 &= \sqrt{11-5x} \\
 2x + 16 &= \sqrt{11-5x} && | (\)^2 \\
 4x^2 + 64x + 256 &= 11 - 5x && | -11 + 5x \\
 4x^2 + 69x + 245 &= 0 && | : 4 \\
 x^2 + \frac{69}{4}x + \frac{245}{4} &= 0 && | p-q\text{-Formel} \\
 x_{1/2} &= -\frac{69}{8} \pm \sqrt{\frac{4761}{64} - \frac{3920}{64}} \\
 &= -\frac{69}{8} \pm \frac{29}{8} \\
 x_1 = -\frac{69}{8} + \frac{29}{8} &= -5 && x_2 = -\frac{69}{8} - \frac{29}{8} = -\frac{98}{8} = -\frac{49}{4}
 \end{aligned}$$

Probe mit $x_1 = -5$:

$$\begin{aligned}
 \frac{2}{\sqrt{-5+6}} + \sqrt{-5+6} &= \frac{\sqrt{11-5 \cdot (-5)}}{2 \cdot \sqrt{-5+6}} \\
 \frac{2}{1} + 1 &= \frac{6}{2} \\
 3 &= 3
 \end{aligned}$$

Probe mit $x_2 = -\frac{49}{4}$:

$$\begin{aligned}
 \frac{2}{\sqrt{-\frac{49}{4}+6}} + \sqrt{-\frac{49}{4}+6} &= \frac{\sqrt{11 - \frac{49}{4} \cdot \left(-\frac{49}{4}\right)}}{2 \cdot \sqrt{-\frac{49}{4}+6}} \\
 \frac{2}{\sqrt{-25}} + \sqrt{-25} &= \frac{\sqrt{\frac{2577}{16}}}{2 \cdot \sqrt{-25}}
 \end{aligned}$$

An dieser Stelle muss abgebrochen werden, da bei mehreren Wurzeln der Wurzelinhalt **negativ** ist. Es gibt keine (reellen) Lösungen.

Aus dem Ergebnis der Proben ergibt sich die Lösungsmenge: $L = \{-5\}$

4.20 Aufgabe 20

$$\sqrt{5x+6} - \sqrt{2x+6} = \sqrt{10-6x} - \sqrt{5x+6} \quad | + \sqrt{5x+6}$$